

STUDII SULLE FORMICHE DELLA FAUNA NEOTROPICA

di CARLO EMERY

I.

FORMICHE DI COSTA RICA

raccolte durante l'anno 1889

dal Signor ANASTASIO ALVARO, direttore del Museo Nacional in S. José.

- 1.
- Eciton hamatum*
- Fab.

Jiménez ♀.

- 2.
- E. Foreli*
- Mayr.

Jiménez, S. Carlos, Pozo Azul, Alajuela. ♀.

- 3.
- E. vagans*
- Ol.

Alajuela.

- 5.
- E. mexicanum*
- Rog.

Liberia.

- 4.
- E. crassicornis*
- Sm.

Alajuela.

- 6.
- E. cocum*
- Latr.

Alajuela, Jiménez ecc. (V. anche n. 13.)

- 7.
- E. omnivorum*
- Kollar.

Jiménez, Alajuela.

- 8.
- E. spininode*
- n. sp.

♀ Opaca, ubique conseruissime punctata, cum punctis majoribus piligeris; brunnea, mandibulis pedibusque pallidioribus; capite lato, postice truncato, angulis rotundatis, melanoto mulico, modice depresso, petioli nolis subaequalibus, longioribus quam latioribus, primo subtus spina acutissima (in ♀ minore tantum dente acuto) instructo, unguiculis dentalis. Long. 3 $\frac{1}{2}$ — 6 $\frac{3}{4}$ mm.

Alajuela.

Questa specie si avvicina molto all'*E. omnivorum*, da cui differisce per la scultura del corpo, per la grandezza minore, per il capo più troncato e meno rotondato indietro, per le antenne di poco più spesse, per i nodi dei pedan-

cello addominale appena più stretti, e specialmente per la spina acuta del 1º di essi, che però nei più piccoli esemplari è meno sporgente e ridotta ad un minuto dente.

9. *E. pilosum* Sm.

San Carlos.

10. *E. Alfaro* n. sp.

♀ *Pilosa, rufo-testacea, mandibulis, ore et marginibus fere ac anterius fuscis, abdomine pedibusque pallidis, nitida. Caput latitudine sua maxima longius, postice late cingulatum, angulis posticis (praesertim in ♀ minoribus) acuminatis, sparse punctatum et in ♀ maxima supra, circum punctula piligera, foveolis latis, valde superficialibus, certa luce tantum conspicuis impressum, oculis minutissimis, testaceis, mandibulis striatis et disperse punctatis, margine masticatorio obliquo, edentulo, antennis elongatis, scapo apice parum incrassato, haud dilatato, flagelli articulis penultimis longioribus quam crassioribus. Thorax compressus, elongatus, pronoto antice cum carinula transversa, sutura meso-mesonotali leviter impressa, melanoto postice brevissime truncato, disco pro-mesonotali sparse grosse punctato, nitido; melanoto et pleuris subopacis, puncis elongatis, magis minute in rugas confluentibus. Abdomen nodis pedunculi subaequalibus, parum longioribus quam latioribus, primo punctis obliquis impresso. Unguiculi simplices. Long. 3 — 6 $\frac{1}{4}$ mm. Antennarum operariae maximae caput $\frac{4}{3}$ mm., flagellum $1 \frac{3}{4}$ mm.*

S. José.

Si avvicina agli *E. Spegazzinii*, *Hetschkoii*, *angustinode*, *nitens* o *californicum*; differisce dal primo pel colore testaceo, da tutti pel torace stretto, e per le antenne lunghe, con lo scapo appena ispessito all'apice.

11. *E. (Labidus) Burchelli* Westw.

Alajuela ♂. Secondo le osservazioni di F. Müller è il ♂ dell'*E. Foreli*.
12. *E. (L.) Esebecki* Westw.

Alajuela. ♂.

13. *E. (L.) Servillei* Westw (1).

Alajuela ♂.

(1) Queste pagine erano scritte quando ebbi dal Sig. Alfaro un certo numero di esemplari di questo *Labidus* insieme con molte ♀ dell'*E. coecum*, alla quale specie devo essere riferito come ♂. Credo che il *L. Sayi* Bald. non sia specificamente diverso da *L. Servillei*, da cui differisce appena per l'articolo basale dei tarsi posteriori meno spesso.

14. *Centromyrmex Alfaro* n. sp.

♀ *Obscure ferruginea, thorace pedibusque rufescens, nitidissima, sparse pilosa, haud pubescens. Caput latitudine maxima brevius, lacui punctis magnis dispersis impressum, foveis antennalibus subtiliter punctatis minus nitidis, clypeo convexo, medio elevato, sine carinulis; mandibulae margine masticatorio denticulata, lateribus sulco obliquo, ut in Ponera sulcata et affinis decurrente. Thorax supra haud impressus, punctis foveiformibus dispersis sculptus, mesonoti disco postice utrinque depresso et apice angustato, metanoto antice fortiter compresso, superficie basali in declivem sensim transcente, pleuris minus disperse grosse punctatis, metapleurii striatulis. Abdomen pedunculo supra rotundato, antice superficie obliqua subplana, nitidissima, subtus antice eminentia compressa, obtuse angulata segmenta reliqua nitida, punctis minutis sparsis et aliis sparsissimis majoribus oblique impressis, piligeris. Long. 7 $\frac{3}{4}$ mm.*

Alajuela. Un solo esemplare privo di antenne (1).

15. *Typhlomyrmex Rogenhoferi* Mayr.

razza robustus n. st.

♀ *A typo speciei differt statura majore (4 $\frac{1}{2}$ 5 mm.), sculptura mesonoti transversim striati et nodo pedunculi breviore antrosum, minus angustato.*

Alajuela.

Negli esemplari del Pará e di S. Catharina, cioè nella forma tipica del *T. Rogenhoferi*, il pronoto e il mesonoto sono piuttosto fortemente punteggiati, il metanoto quasi levigato e molto lucido. Nella nuova razza, la punteggiatura del mesonoto confluisce per formare delle rughe o strie trasversali.

16. *Ectatomma tuberculatum* Latr.

Jiménez, Pozo Azul.

17. *E. ruidum* Rog.

Alajuela.

18. *E. (Holcoponera?) bispinosum*

♀ *Ferrugineo-testacea, pedibus , , longe pilosa. Caput ovatum, postice angustius et obtuse subtruncatum,*

(1) Il genere *Spalacomyrmex* da me fondato sopra una specie di Birmania (S. Fea) non è distinto dal gen. *Centromyrmex*, al quale vanno riferite ancora, oltre la specie tipica del Mayr (*C. Bohemannii*), la *Pachycondyla brachycola* Rog.

rugis elevatis, grossis, antice longitudinalibus, postice reticulatis sculptum, oculis parvis, subhemisphaericis, clypeo modice convexo, antrorsum arcuatim producto, longitrorum striato, cum impressione media longitudinali lata, mandibulis striatulis, trigonis, elongatis, apice acutissimo, margine externo sinuato, interno seu masticatorio vix obsolete denticulato, antennis gracilibus, flagelli articulis omnibus longioribus quam crassioribus, duobus primis subaequalibus, crassitie sua duplo longioribus. Thorax pronoto tenui, arcuatim rugoso, meso-et metanoto transversim rugosiss, hoc utrinque spina longa, obliqua, curvata armato, sutura pro-mesonotali distincta, meso-melanotoli impressa. Abdominis segmentum petiolare latitudine sua paulo longius, supra convexum et transverse rugosum, antice utrinque cum lobulo dentiformi, subtus lamina antice posticeque acute dentiformi; segmentum 2. antice transverse, postice longitrorum, grosse, irregulariter rugosum; segmentum 3. rugis regularibus longitudinalibus. Pedes elongati, coxis posticis spinula gracili armatis, calcaribus posterioribus longe pectinatis. Long. 7½ mm.

Jiménez un esemplare.

Riferisco questa specie al sottogenere *Holcoponera*, quantunque per le antenne gracili e per l'impressione longitudinale del clipeo si scosti dalle altre due specie, mentre poi differisce da tutti gli *Ectatomma* finora descritti per le spine del metanoto. Forse meriterebbe di costituire un nuovo sottogenere. La spina delle anche posteriori si ritrova nell'*E. striatulum* e forse anche nell'*E. concentricum* che non conosco e che sospetto non sia specificamente diverso dall'*E. striatulum*; dico questo, perchè posseggo qualche esemplare che per la struttura delle antenne e del torace e per la scultura, poco più forte di quella dell'*E. striatulum*, sembra stabilire la transizione fra le due forme.

19. *E. (Gnampygenys) concinnum* Sm.

Jiménez ♀.

20. *E. (G.) annulatum* Mayr.

Alajuela, Jiménez ♀ ♀.

21. *E. (G.) lineatum* Mayr.

Alajuela, Jiménez ♀.

22. *E. (G.) rostratum* Mayr.

Alajuela una ♀.

Questa specie, riferita dal Mayr con dubbio al sottogenere *Rhytidoponera*, è una *Gnampygenys* affine all'*E. triangulare* Mayr, da cui differisce

principalmente per le mandibole lucide, striate soltanto all'estrema base e per il poduncolo longitudinalmente striato. La striatura longitudinale regolarissima del corpo è più fina che nell'*E. regulare*, molto meno che nell'*E. annulatum*.

23. **Paraponera clavata** Fab.

Jiménez, Sarapiquí ♀ ♀.

24. **Platythyrea cineracea** Forst.

Liberia ♀.

25. **Pachycondyla fuscoatra** Rog. razza *transversa* n. st.

Alajuela, Juan Viñas.

Questa forma differisce dal tipo per la striatura trasversa del pronoto e per l'ultimo segmento dell'addome segnato di una impressione longitudinale distinta, bordata di piccoli aculei. La punteggiatura dell'addome è anche più forte che negli esemplari di Colombia.

26. **P. harpax** Fab.

Alajuela.

27. **P. gagatina** n. sp. (1).

Jiménez.

28. **P. aenescens** Mayr.

Alajuela, una ♀.

29. **P. flavigornis** Fab.

Alajuela, Jiménez.

30. **P. flavigornis**, var. *obscuricornis* Em.

Alajuela.

31. **P. apicalis** Latr.

Alajuela, Pozo Azul, Juan Viñas.

32. **P. pallipes** Sm. var. *moesta* Mayr.

Jiménez.

33. **P. lineaticeps** Mayr.

Jiménez.

34. **P. undentata** Mayr.

Alajuela, Jiménez.

(1) Le descrizioni di questa e delle altre specie nuove di *Pachycondyla* verranno pubblicate in una revisione del genere negli Annales de la Société Entomologique de France 1890.

35. *P. striatinodis* n. sp.

Alajuela, Jiménez.

36. *P. villosa* Fab.

Alajuela, Jiménez.

37. *P. foetida* Ol.

Alajuela, Jiménez.

38. *Ponera stigma* Fab.

Alajuela.

39. *P. nitidula* n. sp.

♀ *Nitida, sparse pubescens et vix pilosa, nigra, mandibulis, flagellis pedibusque ferrugineis. Caput latitudine sua maxima circiter quarta parte longius, haud crebre, subtilissime punctatum, mandibulis laevibus, sparse punctatis, margine masticatorio irregulariter 10-11 denticulato, clypeo integro, medio obtuse carinato, laminis frontalibus antice dilatatis, fronte inter ipsas haud sulcata, sed plana, elevata, crebrius punctata. Thorax subtilius et sparsius punctatus, ante metanotum leviter impressus, hoc modice compresso, postice abrupto, superficie declivi longiore quam basalis: Abdomen squama pedunculari lata, subrotunda, superne subtiliore, antice convexa, postice planata. Long. 3 1/2 mm.*

40. *Lobopelta pusilla* n. sp.

♀ *Fusca, mandibulis, antennis pedibusque rufescentibus, luevis et nitidissima, sparse breviter pilosa, capite elongato, lateribus subparallelis, mandibulis angustis, acutis, antennarum scapo modice longo, robusto, flagello crasso, cuius articuli penultimi crassitie sua haud longiores sunt. Thorax elongatus, melanoto longo, postice vix breviter declivi, ibique concavo et ultrinque ad latera articulationis pedunculi obtuse subdentato. Abdomen pedunculo longiore quam latiore, antice angustato, supra oblique truncato. Long. 2 1/2 3 mm.*

Jiménez.

Si avvicina molto alla *L. australis* Em. dalla quale differisce per la statura minore e per le antenne relativamente più grosse, con gli articoli del flagello più corti che larghi. È la più piccola delle Lobopelta finora conosciuto.

41. *Leptogenys punctaticeps* Em. Ann. Soc. Ent. Fr. 1890.

Jiménez un solo esemplare.

42. *Anechetus (Stenomyrmex) emarginatus* Fab.

razza *striatus* Em. Ann. Soc. Ent. Fr. 1890.

Jiménez, Alajuela.

43. *Odontomachus hastatus* Fab.

Jiménez.

44. *O. chelifer* Latr.

Jiménez, Alajuela, Palmares.

45. *O. haematodes* L. (1).

A. razza tipica. ♀ con scultura forte, con l'addome levigato; di colore scuro con i piedi talvota più o meno ferruginei.

Alajuela, Jiménez.

B. razza: *erythrocephalus* n. st.

♀ *Capite ferrugineo, fronte obscuriore, mandibulis fuscis, pedibus rufescenti-testaceis, abdomine laevi, nitido.*

Alajuela, Jiménez.

Questa razza mi pare abbastanza costante per meritare di essere distinta con nome proprio; io non ho trovato forme intermedie fra essa e il tipo descritto sopra, col quale ha comune la scultura.

C. razza *laticeps* Rog.

Alajuela, Jiménez.

D. razza *striativentris* n. st.

♀ *Præcedentii quoad staturam atque capitis formam magnitudinemque similis, fusca, pedibus testaceis, occipite obscure ferrugineo, abdomine ni-*

(1) L'*O. haematodes* offre in America molte varietà e razze ben distinte, delle quali Roger ha tentato per primo la classificazione. Oltre alle forme di Costa-Rica, di cui le A. e B. sono pure molto diffuse altrove, conosco ancora le seguenti:

F. razza *pubescens* Rog.

Brasile, prov. Pará.

G. razza *insularis* Guér.

Attribuisco questo nome a piccoli individui con striatura sottile, provenienti da Cuba e Haiti. Usando deboli lenti, non si giunge a risolvere la scultura del capo, il quale sembra così dotato di splendore sericeo, senza strie appariscenti, cioè come lo descrive il Guérin; il colore è come negli esemplari meno scuri della razza tipica.

Una varietà più piccola (7-8 mm. con le mandibole), ma del resto simile alla precedente per colore e scultura, rappresenta l'*O. hirsutiusculus* Sm. L'ho ricevuta dal Paraguay (Balzani); un esemplare simile della Florida mi fu mandato dal Dr. El.

Le forme indo-australiane e africane dell'*O. haematodes* (*simillimus* Sm.) differiscono poco o nulla le une dalle altre e sono molto vicine alla forma tipica. Si possono però considerare come razze della medesima specie le forme australiane *O. coriarius* Mayr e *cephalotes* Sm. con le loro varietà.

gro, consertissime longitrorsum striato, opaco. L. (cum mandibulis) 12 $\frac{1}{2}$ mm.

Jiménez.

Forso questa forma meriterebbe di essere considerata come specie distinta. Per la scultura dell'addome ricorda la forma australiana *O. cephalotes* Sm.

E. var.? *microcephalus* n. var? Tav. V, fig. 1.

♀ *Obscure fusca, mandibulis fusco-ferrugincis; articulationibus pedum larisque rufescensibus, capite subtilius striolato, sericeo-nicante, brevi, ad oculos latissimo, postice valde angustato, foveis antennalibus postice fere evanescentibus, vertice cum ocello minuto; caeterum O. haematodes similis. Abdomen elongatum, laxe, segmento 2º vix obsolete reticulato. Long. (cum mandibulis) 10-11 mm.*

Alajuela.

Quantunque io abbia veduto 3 esemplari fra loro simili di questa forma, dubito forte che si tratti di una anomalia individuale, più che di una razza o varietà distinta. È notevole l'allungamento dell'addome, forse per sviluppo degli ovari, associato alla piccolezza del capo. A questo proposito è interessante rilevare l'esistenza di una varietà consimile dell'*O. chelifer* (var.? *leptocephalus* mihi. Tav. V, fig. 2). Essa ha la scultura di questa specie, ma ne differisce per il capo piccolo e ristretto indietro, come nell'*O. microcephalus*, e per l'enorme sviluppo dell'addome; il solo esemplare a me noto fu raccolto a Rio Grande do Sul dal v. Jhoring: Tra le formiche raccolte nel Venezuela dal Simon, trovasi pure una ♀ della *Pachycondyla villosa* notevole per la testa piccola e l'addome voluminoso più del consueto: posseggo pure un esemplare analogo all'*Ectatomma tuberculatum*.

Questi fatti sembrano indicare l'esistenza presso talune formiche di una forma di microcefalia delle operaie, accompagnata a maggior sviluppo degli organi sessuali. Descriverò più innanzi un altro caso analogo nel genere *Phidole*.

La forma *microcephalus* dell'*O. haematodes* era nota al Roger che ne fa cenno, ma senza darle un nome speciale.

46. *Pseudomyrma gracilis* Fab.

razza *mexicana* Rog. Varietà con torace rosso (salvo lo scutello e il mesonoto, o lo scutello solo, neri nelle ♀, il mesonoto nero nelle ♂) e il peduncolo o il primo segmento di esso rosso.

Alajuela.

47. **P. nigropilosa** n. sp. (1).

Liberia due esemplari.

48. **P. Künckeli** n. sp.

Alajuela ♀ ♀ ♂.

49. **P. Belti** n. sp.

Alajuela, Jiménez, Liberia: ♀ ♀ ♂; è la specie p delle Acacie.

50. **P. spinicola** n. sp.

Alajuela, Jiménez, Pozo Azul, ♀ ♀ ♂ nelle spine delle Acacie.

51. **P. nigrocincta** n. sp.

Alajuela, Jiménez ♀ ♀ ♂, nelle spine delle Acacie.

52. **P. subtilissima** n. sp.

Alajuela ♀ ♀, in alcune spine di una Acacia abitata dalla *P. Belti*.

53. **P. sericea** Mayr.

Alajuela, Liberia ♀.

54. **Tetramorium europunctatum** Rog.

Alajuela.

55. **Megalomyrmex Foreli** n. sp. Tav. V, fig. 3.

♀ *Rufō-testacea, nitidissima, abdomine obscuriore, pilosa, haud pubescens. Capit ovalum, posterius haud conspicue angustatum, occipite lateribus convexo, limite postremo cum margine elevato obsolecto (vel vix angustissimo), laminis frontalibus postice evanescentibus, nec in rugulam arcuatum, foveam antennalem circumscriptentem productis, fovea ipsa longiorrum striatula; antennae articulis flagelli 3-8 crassitie sua haud dimidio longioribus. Thorax pro-mesonoto gibboso, metanoto postice ad receptionem pedunculi profunde excavato, utrinque gibbere, seu tuberculo lato, aliquantum compresso, apice rotundato instructo. Abdominis pedunculi segmentum 1. superne antice concavum, subitus basi vix denticulo minutissimo, lateribus stigmatibus prominulis; 2. basi subitus plerumque dente minuto. Long. 6-8 mm.*

Alajuela, Jiménez.

La scultura delle fosse antennali, che non hanno striatura regolarmente

(1) Per la descrizione di questa e delle altre nuove specie di *Pseudomyrma* veggasi la 2^a parte di questi « Studii ».

concentrica, e l'occipite convesso, col bordo posteriore appena sottilissimamente marginato distinguono bene questa specie dalle congeneri (1).

55. *Aphaenogaster phalangium* n. sp. Tav. V, fig. 6, 7.

S. Gracilis, pedibus antennisque valde elongatis, pilis crassis, obliuis conspersa, ferruginea, opaca, abdomine (excepto pedunculo) nitido, fusco. Caput elongatum, retrorsum conice angustatum, margine collari elevato, nigricante, confertissime punctatum, antice longitrorsum rugosum, mandibulis striatis et sparse punctatis, clypei margine antico medio subrecto. Thorax similiter confertim punctatus, rugosus, rugis in metanoto transversis, sutura meso-metanotali impressa, metanoto omnino nubico. Abdo-

(1) Il quadro seguente varrà a far riconoscere le forme a me note del genere *Megalomyrmex*.

a Capo più allungato e ristretto indietro, con orlo posteriore munito di distinto margine rilevato; fossa antennale contornata indietro da rughe concentriche.

b Statura più grande; metanoto senza tubercoli elevati; stigmo del 1º segmento del peduncolo non sporgenti; 2º segmento del peduncolo senza dento inferiormente.

c Colore rosso; 1º segmento del peduncolo meno allungato, con una spinetta acuta sotto la sua base; faccia dorsale del metanoto più o meno solcata per ricevere il 1º nodo del peduncolo, quando questo è elevato. L. 8-9 1/4 mm.

leoniinus Forel (Columbia).

cc Colore picco, 1º segmento del peduncolo più allungato, senza spinetta inferiore. Quando il peduncolo è elevato, il 1º nodo non poggia sul dorso del metanoto, che è piano, senza vestigio di solco. L. 10 mm.

Staudingeri n. sp. (Perù, Iquitos).

bb Statura più piccola (7 1/2 mm.); metanoto con due tubercoli elevati, fra i quali viene a collocarsi il 1º segmento del peduncolo, quando questo è elevato; le spine di questo segmento sono distintamente sporgenti; il 2º segmento ha una spinetta sotto la sua base.

Latreillei n. sp. (Perù, Cumbayo).

aa Capo meno allungato, non distintamente ristretto indietro, con occipite convesso, senza margine rilevato notevole; fosso antennale non marginato, ma striato longitudinalmente. Metanoto munito di due tubercoli, fra i quali viene a poggiare il nodo del 1º segmento del peduncolo.

Forelli n. sp. (Costa Rica).

La forma che ho chiamata *Staudingeri* differisce poco dal *leoniinus* e potrebbe essere considerata come razza geografica del medesimo; ne ho veduto un solo esemplare. Del *M. Latreillei* ho pure un esemplare solo; sospetto che questo possa essere la specie descritta da Fabricio e da Latreille col nome di *Formica bituberculata*, però la descrizione di Latreille conviene egualmente ad essa o al *M. leoniinus*. Nel dubbio, ho dato alla specie un nome nuovo, aspettando che l'esame di esemplari tipici venga a risolvere la questione. Per la forma del capo e la scultura della fossa antennale, veggansi le fig. 3, 4 e 5 a tav. V.

men pedunculi segmento 1. opaco, antice breviter petiolato, supra nodo elongato, 2. ovali, antice angustiore, minus opacō, minus conserlin el subtilius punctulō, foveolis setigeris distincis; reliquias segmentis praecler fo-veolus setigeras, vix sculptis, nitidis. Pedes opaci, confertissime punctati. Long. 6 $\frac{1}{2}$ -7 mm.; scapi 2 $\frac{1}{2}$; pedis postici extensi 9.

♂ Ferrugineus, quoad sculpturam, colorem et nitorem operariae similis, capite postice similiter conice angustato et marginato, mandibulis acute denticulatis, oculis permagnis, thorace scutello gibboso, elevato, metanoto depresso, mutico, pedunculi segmento 1º breviore quam in operaria. Alae flavescentes, breves, anticae in specimine uno cella cubitali una clausa, in altero costa transversa pallidissima ramos costae cubitalis connectente. Long. 6 $\frac{1}{2}$ -6 $\frac{3}{4}$ mm. Ala ant. 4 $\frac{1}{2}$.

Alajuela, Jiménez.

57. *A. araneoides* n. sp. Tav. V, fig.

♀ Praecedenti proxime affinis et ~~proxime~~ ~~simili~~ ~~specie~~ ~~quodam~~ species diversa. Abdomine ferrugineo, opaco et confertissime punctato atque metanoto tuberculis minutis instructo agnoscenda. Long. 7-7 $\frac{1}{2}$ mm.; Scapi sere 3, pedis postici 10 $\frac{1}{2}$.

Alajuela, Jiménez.

Queste due specie fra loro molto affini rappresentano in America il gruppo *Ischnomyrmex*, ma differiscono per la scultura dalle forme orientali.

58. *Monomorium pharaonis* L.

Alajuela, Jiménez.

59. *M. carbonarium* Sm.

S. José.

Gli esemplari costaricensi rassomigliano molto a quelli dell'Isola S. Tommaso raccolti dal Forel; però il loro metanoto è ancora più distintamente tubicolato.

60. *Pheidole absurdula* Forel. Tav. V, fig. 9, 10, 11.

Alajuela, S. José, Liberia.

Questa specie singolare è rappresentata da due distinte varietà di colore; nell'una, il soldato è tutto di un bruno scuro, con le antenne e le zampe più chiare e col margine anteriore del capo rosso, nell'altra, il corpo è bruno-testaceo e la testa rosso chiaro, avente il margine della bocca e le mandibole rosso cupo. Descrivo la ♀ che non era nota.

♀ Fusco-ferruginosa, antennis, pedibus et pedunculo dilutioribus, ocipite et abdome obscurioribus, nitida, pilosa. Caput postice sine collo,

occipite obtuse truncato, distincte emarginato, nitidum et luceo, clypeo lateribus striato, foveis antennalibus cum rugis arcuatis concentricis, rugisque nonnullis prope oculos longitudinalibus, mandibulis striatis, antennarum flagelli articulis 2-8 crassitie sua haud brevioribus. Thorax prono- haud tuberculato, laevi, vix margine antico punctulato, mesonoto convexo, laevi, sine impressione, mesopleuris et metathorace reticulato-punctatis, hoc tam lato quam longo, superne convexo et spinulis brevibus, erectis, acutis armato. Abdominis nitidi segmentum petiolare 1. angustum, superne modice elevatum, 2. lateribus rotundatum, paulo latius quam longius. Long. 2 $\frac{3}{4}$ -3 mm.

Adoperando il quadro analitico del Mayr si giunge al n. 37 cioè alle *Ph. auropilosa* e *pusilla*, dalle quali questa specie è facile a distinguere.

Credo dover riferire alla *Ph. absurda* due esemplari singolari di Alajuela. Il torace e il peduncolo sono fatti come nel soldato di questa specie, se non che il metanoto è poco più largo e le spine più brevi, più distanti e molto allargate alla base. Il capo ha una forma particolare, intermedia fra quella della ♀ e del soldato, coi lati poco divergenti in avanti, la linea frontale marcata e prolungata fino all'occipite; l'occhio anteriore è distinto; una fascia mediana liscia occupa il mezzo della fronte e del clipeo, mentre i lati della fronte, le guancie e la porzione anteriore dei lati del capo sono coperti di sottili rughe; il resto del capo è liscio, con grossi punti sparsi. Lo scapo delle antenne non raggiunge l'occipite. Le mandibole sono liscie con grossi punti sparsi, il loro margine interno è dentellato, con due denti apicali più grandi. L'addome è molto lungo e tumido. Lunghezza totale 7 $\frac{1}{4}$ -7 $\frac{3}{4}$ mm. di cui 1 $\frac{1}{2}$ spettano al capo, 4-4 $\frac{1}{2}$ all'addome (veggi Tav. V. fig. 10, 11).

Suppongo che questi esemplari siano femmine partenogenetiche.

61. *Ph. Radowszkowskii* Mayr. razza *militaris* n. st.

Miles. *Typo ex Cajenna multo major et aliquantulum rudius sculptus, abdомине opaco, ubique subtiliter, basi subtilius et profundius reticulato-punctato, marginibus segmentorum tantum nitidulus, impressione mesonoti minus profunda, spinis metanoti acutioribus. Long. 3 $\frac{1}{4}$ -4 $\frac{1}{2}$ mm.*

♀ *Difert similiter a typo propter staturam majorem et magis robustam, atque sculpturam abdominis. Long. 2 $\frac{1}{4}$ -2 $\frac{1}{2}$ mm.*

Alajuela (1).

(1) Un'altra razza della medesima specie è rappresentata dagli esemplari di Rio Grand do Sul raccolti dal Dr. von Jhering.

razza *australis* n. st. Miles. A *typo cajennensi propter staturam paulo major-*
Anno XXII.

62. *Ph. biconstricta* Mayr. razza *bicolor* n. st.

Miles. A typo speciei differt colore diverso, scilicet capite thoraceque ferrugineis (hoc plerumque obscuriore), abdомine piceo, sulco metanoti antice saepe obsoleto vel minus profundo, spinis subtilibus, valde divergentibus, abdомine subtilius reticulato, tantum basi subopaco.

♀ Similiter a typo colore obscure ferrugineo, capite plerumque dilutiore, abdомineque nitido, basi superficialissime reticulato distinguenda.

È notevole in questa razza la forma delle spine del metanoto, le quali sono come piegate in fuori e quindi molto fortemente divergenti; anche il colore e la scultura dell'addome la fanno facilmente riconoscere.

63. *Ph. biconstricta* Mayr razza *rubicunda* n. st.

Miles. Capite majore et latiore, sculptura reticulato-punctata occipitis et longitrorsum rugosa frontis genarumque minus subili a typo (cui est proxime affinis) distinguendus. Thorax etiam robustior. Sculptura abdominis ut in typo, nodi pedunculi paulo latiores. Color lactic rufo-testaccus (in typo lividus). Long. 5-5 $\frac{1}{2}$ mm.; caput cum mandibulis 2.4 \times 1.9 (Caput typi 2.2 \times 1.6).

♀ A typo similiter statura majore et validiore, capite paulo minus elongato atque colore rufescente distincta. Long. 3 $\frac{3}{4}$ -4 mm.

Alajuela.

Le differenze cennate nella diagnosi del soldato mi sono state indicate dal Prof. Mayr, dietro confronto con l'esemplare tipico della sua collezione, e confermate dal confronto di un esemplare del Venezuela che riferisco al tipo, quantunque di colore più scuro. La ♀ è stata da me confrontata con esemplari tipici mandatimi dal Mayr.

Una varietà della razza *rubicunda* proveniente da Santarem nella provincia di Pará (2 Soldati, 3 ♀) differisce dalla forma di Costa Rica per la scultura un poco più sottile e il colore meno rossiccio, nei quali caratteri si accosta al tipo. -- Un altro soldato pure del Pará è più piccolo (4 $\frac{1}{2}$ mm.) e tutto di color bruno scuro, con le rughe longitudinali della parte anteriore del capo più marcate e più regolarmente parallele; le spine sono sen-

rem, colorem dilutiorem et sculpturam capiti latioris diversam agnoscedunt: puncta sunt subtiliora et minus profunda, rugae genarum reticulatus, rugae frontis parallelae minus conspicuae, laminae frontales paulo breviores; spinae metanoti breviores et basi crassiores. Long. 3 $\frac{1}{2}$ mm.

♀ Similiter capite latiore et subtilius punctata, spinae metanoti basi crassioribus et colore dilutiore, sordide ferruginea-testaceo a typo diversa. L. 2 $\frac{1}{4}$ mm.

sibilmento divaricate, ma meno che nella razza *bicolor*. Lo darò il nome di var. *fuscata*; forse meriterebbe di costituire una razza distinta.

64. *Ph. Susannae* Forel. var. *obscurior* Forel.

Alajuela.

Il soldato differisce dal tipo brasiliano di questa varietà per la statura un poco più robusta e la scultura più forte del capo.

65. *Ph. Fiorii* n. sp.

Miles. *Testaceus, opacus, abdomine etiam opaco, obscuriore; longe pilosus et sparse pubescens. Caput modice elongatum, postice profunde excisum, lateribus subparallelis, laminis frontalibus haud prolongatis; unidique crenatissime punctatum, genis et fronte antice longitrosum rugosum, lateribus irregulariter rugoso-reticulatis, sine impressione pro scapo, clypeo medio sublaevi, mandibulis nitidis, sparse punctatis; antennis gracilibus, scapo basi arcuato, flagelli articulis 2-7 fere duplo longioribus quam crassioribus. Thorax elongatus, pronoto convexo, haud distincte tuberculato, mesonoto modice impresso, melanoto sine sulco mediano, spinis longis, acutissimis, oblique erectis, longioribus quam inter se basi distantibus, crenatissime punctatus, opacus. Abdomen pedunculo gracili, nodo 2^o subgloboso, segmenti sequentis dimidio antico punctato, opaco. Pedes nitidi, graciles. Long. 4 1/2-4 3/4 mm. Caput cum mandibulis 1.7×1.3.*

Jiménez.

Si avvicina molto alla *Ph. Susannae*, per l'abito generale e il sistema di scultura. Il capo è interamente opaco e le rughe reticolate sono meno marcate, rimanendo predominante la punteggiatura a ditale da encire che è più grossa e profonda. Il torace è più gracile, con l'impressione del mesonoto meno marcata; le spine del melanoto molto più lunghe e divergenti, gracili, acutissime, quasi tanto lunghe, quanto sono distanti l'una dall'altra le loro punte. La ♀ quasi non differisce dalla ♂. *Susannae* fuorché per le spine molto più lunghe.

Dedico la specie all'egregio entomologo Prof. Andrea Fiori.

66. *Ph. punctatissima* Mayr.

Alajuela, S. José, Jiménez.

67. *Ph. subarmata* Mayr. Tav. V, fig. 12, 13.

Alajuela, S. José.

Il soldato offre un
frontale, la cui estremità

lla forma delle lamino
sibile quando si guarda

l'insetto di fianco: inoltre i due denti del mento, che esistono più o meno sviluppati in altre specie, sono singolarmente sporgenti. Sui lati del capo, uno spazio levigato e debolmente depresso corrisponde all'estremità dello scapo. Questi caratteri non essendo menzionati dal Mayr nella descrizione della specie, sospettai di aver d'innanzi una specie nuova; ma lo stesso Mayr, a mia richiesta, ebbe la gentilezza di riscontrarne l'esistenza nel tipo (1).

68. *Solenopsis geminata* F.

Abbondantissima in tutte le località.

69. *S. succinea* n. sp.

♀ *Fulva, abdome pallidiore, nitidissima, sparse punctata, punctis pilos longos gerentibus. Caput modice elongatum, postice vix emarginatum, angulis posticis rotundatis, mandibulis lacvibus, sparse punctatis clypeo sine carinis, margine inermi, medio leviter sinuato. Antennarum flagelli artculus 1. sequentibus tribus una aequilongus, 2-7 parum crassiores quam longiores. Thorax sutura meso-metanotali distincte impressa, melanoti facie declivi planata vel medio obsolete impressa. Abdomen segmenti petiolaris primi nodo transverso, superne rotundato, segmentum secundum altitudine haud superante. Long. circiter 2 1/2 mm.*

♀ *Operariae quo ad colorem et sculpturam pertinet fere similis, punctis*

(1) Caratteri analoghi o ancora più marcati si riscontrano nella specie seguente

Ph. cornutula n. sp. Miles. *Lacte rufus, margine capitis antico, mandibulisque ferrugineis, petiolo pedibusque testaceis, nitidus et longe pilosus. Caput valde elongatum, postice profunde emarginatum, lateribus subparallelis, vertice sulcato, antice striatum, postice laeve, vix dispersissime minuto punctatum, laminis frontalibus brevibus, antico et sursum acute angulatim productis, lateribus capitis cum area depressa, sublaevi, pro apice scapi, oculis minutis, valde depresso, clypeo planato, laevissimo, postice cum tuberculo minuto, mandibulis trigonis, productis, parum convexis, superne laevibus, latere striatis. Antennae breves, articulis flagelli distincte brevioribus quam crassioribus, articulo clavae ultimo praecedentibus duobus una subaequilongo. Thorax sutura pro-mesonotali obsoleta, disco pro-mesonotali convexo, utrinque subgibboso, metanoto superne late, haud profunde longitrussum sulcato, spinis validis, acutis, erectis. Abdominis nitidi pedunculus articulo Iº gracili, supra nodo squamiformi truncato, 2º transverso, lateribus obtuse angulato. Long. 2 1/2 mm. (Tav. V, fig. 14, 15).*

Asuncion nel Paraguay. Un esemplare raccolto dal Dott. L. Balzan. Si avvicina molto alla *Ph. subarmata*, ma è più piccola, il suo capo è più allungato, con le lame frontali più sporgenti sul profilo e i denti del mento ancora più sviluppati. Le antenne sono più brevi, con gli articoli del flagello più corti, l'ultimo della clava molto più grande.

tamen majoribus et magis confertis, maculaque verticis ocellos includente fusca. Antennae 10-articulatae. Petioli abdominis nodi, praesertim secundus maiores et latiores. Alae hyalinae, costis et stigmate testaceis. Long. $2\frac{3}{4}$ - $3\frac{1}{4}$ mm.

♂ Nitulissimus et sparse subtilissime punctatus, abdomen fere impunctato; niger, pedibus piceis, articulationibus tarsisque rufescens, antennis obscure testaceis; capite postice valde angustato, oculis permagnis, antennarum scapo brevissimo, mesonoto antice sulco longitudinali medio profundo, intus punctulato. Long. 3 mm.

Jiménez molti esemplari dello stesso nido.

La ♀ e la ♂ sono facili a riconoscere dal clipeo privo di carene e di denti e dalla scultura. Delle altre due specie con clipeo inorme, la *S. sulphurea* Rog. è più piccola ed ha il capo senza punti; la *S. similis* Mayr ha il metanoto fittamente punteggiato. Nella ♀, le antenne sono di soli 10 articoli come nella ♀ (1). Il ♂ è notevole pel solco longitudinale profondo che si trova nel mezzo della parte anteriore del mesonoto.

70. *Tranopelta gilva* Mayr.

Alajuela, Juan Viñas ♂.

71. *Cremastogaster Sumichrasti* Mayr.

Alajuela.

72. *C. brevispinosa* Mayr.

Alajuela.

73. *C. llmata* Sm.

Jiménez.

74. *C. sulcata* Mayr.

Alajuela ♀ ♀ ♂; nido papiraceo nero nei rami di un albero, a 4 m. dal suolo. La sostanza del nido è costituita in massima parte dalle ife di un fungo, con pochi frammenti di tessuti vegetali e comprende delle foglie ancora attaccate al ramo.

75. *C. longispina* n. sp.

♀ Fusca, laevis et nitida, pedibus et saepè etiam pedunculo thoraceque dilutioribus, mandibulis, antennarum articulis 3 ultimis tarsisque flavo-

ornis Em.; dietro
intenna sinistra è
più numero

delle congeneri.

testaceis, pilis longis, tenuissimis, albilibis conspersa. Caput subrotundum, laeve, genis tantum striatulis, unilennarum clava biarticulata. Thorax mesonoto utrinque carina longitudinali, postice usque ad spinas melanoli producta; his longis, tenuibus, divergentibus, aliquantulum sursum curvatis, superficie metanoti inter spinas concava, subtilissime ruguloso-reticulata. Pedunculi abdominis segmentum 1. elongatum, antrorsum angustiatum; 2. subglobosum, sine sulco. Pedes longe pilosi. Long. 2 2/3-3 mm.

Jiménez.

È estremamente affine alla *C. nigropilosa* Mayr, da cui differisce principalmente per i peli più sottili e più radi sul corpo; più radi, lunghi e ritti sulle zampe, per le spine più sottili e divergenti e per coloro dello antenno più gracili, i cui 3 ultimi articoli spiccano con tinta chiara.

76. *Atta Lebasi* Guér.

Alajuela, Jiménez ecc. ♀ ♀ ♂.

Le forme alate, femmine e maschi hanno le ali più scure che nelle altre specie a me note (*sexdens* con la var. *laevigata* Sm. e *fervens* Say), col margine esterno delle anteriori securissimo. Nella ♀, il capo non ha spine né denti all'occipite; l'addome è poco più breve del torace e più largo di esso, col 3^o segmento (1^o dopo il peduncolo) più largo che lungo; tutto il corpo è rosso ferrugineo scuro, mazzato di bruno più scuro ancora e rivestito (anche l'addome) di peluria ritta vellutata.

Il ♂ è notevole per la statuta robusta del torace, il voluminoso addome e il colore testaceo chiaro, con lo snitro del torace bruno. L'occipite ha due soli piccoli denti; le mandibole sono gracili e allungate. Le valvole genitali esterne corrispondono alla descrizione data dal Mayr (Novara Reise p. 81) per l'*Atta cephalotes* ♂; le medie sono piatte, strette e curvate; le interne costituiscono nel loro insieme un apparecchio voluminoso e complicato terminato ad ancora e molto diverso da quello stretto e fatto a gronda tricuspidè dell'*A. sexdens*; l'ipopigio è più largo che lungo, terminato da due punte, comprendenti fra loro una profonda incisura triangolare. — Segnalo solo di passaggio questi caratteri diagnostici del ♂, sperando di potervi ritornare sopra in una revisione delle Atte per la quale sto raccogliendo materiale (1).

(1) L'*A. Lebasi* e l'*A. cephalotes* mi sembrano fra loro strettamente allini e costituiscono insieme un gruppo distinto, in cui le piccole ♀ hanno un solo paio di spine occipitali. Nelle *A. sexdens*, *fervens* e *insularis*, l'occipite porta due paia di spine nelle piccole ♀.

77. *A. Lebasi* var. *columbica* Guér.

Alajuela. Questa forma è a mio parere, una varietà della ♀ major in cui le spine dorsali del pronoto hanno assunto la forma di grossi tubercoli rotondati in cima.

78. *A. (Acromyrmex) hystrix*.

Alajuela, Jiménez ecc. diverse varietà.

79. *Cyphomyrmex deformis* Sm.

Jiménez.

80. *Strumigenys unispinulosa* n. sp.

Alajuela. Per la descrizione veggasi al n. III di questi « Studii ».

81. *Procryptocerus Adorzi* Mayr. var.

Palmaros un esemplare.

82. *Cryptocerus Alfaroii* n. sp.

Alajuela. Per la descrizione di questa e di altre forme nuove del genere, veggasi al n. V di questi « Studii ».

83. *C. cordatus* Sm. razza *multispinus* n. st.

Alajuela, Jiménez.

84. *C. minutus* Fab.

Alajuela, Jiménez.

85. *C. gibbosus* Sm. razza *biguttatus* n. st.

Jiménez.

86. *C. cristatus* n. sp..

Alajuela, Jiménez.

87. *C. umbraculatus* Fab. (*elegans* Sm.).

Alajuela.

88. *C. angulosus* Sm.

Jiménez.

89. *C. Pinelii* Guér (*grandinosus* Sm.).

Alajuela.

90. *Dolichoderus bispinosus* Ol.

Abbondante in quasi tutte le località.

91. *D. lamellosus* Mayr.

Alajuela, Jiménez ♀. Conosciuto finora solo della Nuova Granata. La ♀ è tuttora inedita; mi propongo di descriverla con altre forme del genere in un prossimo numero di questi Studii.

92. *D. lutosus* Sm.

Jiménez.

93. *Iridomyrmex iniquus* Mayr.

var. *nigellus* n. var.

Alajuela.

La ♀ differisce dal tipo soltanto pel torace più disteso, pel mesonoto meno profondamente impresso, pel metanoto più distintamente angoloso (queste differenze risultano dal confronto con esemplari brasiliiani mandatimi dal Mayr). Il colore è piceo con le mandibole, le articolazioni dei piedi e i tarsi di un rosso scuro.

Tutti gl'*Iridomyrmex* nootropici descritti finora sono fra loro strettamente affini, e credo che chi possedesse materiali più completi stenterebbe a definire i limiti delle singole forme.

94. *Dorymyrmex pyramicus* Rog.

Alajuela.

95. *Brachymyrmex coactus* Mayr.

Jiménez.

96. *Camponotus atriceps* Sm.

Alajuela, Jiménez, Pozo Azul ecc.

97. *C. atriceps* razza *stercorarius* Forel.

Alajuela, S. José, Palmares.

98. *C. maculatus* Fab. Syst. Ins. (1) razza *simillimus* Sm.

Alajuela.

99. *C. sexguttatus* Fab.

Alajuela.

100. *C. sexguttatus* razza *Landolti* Forel var.

Jiménez; 3 esemplari con l'addome macchiato.

101. *C. novogranadensis* Mayr.

Alajuela, Jiménez.

102. *C. senex* Sm. razza tipica.

Jiménez, Liberia.

103. *C. senex* razza *planatus* Rog.

Alajuela e altre località. Divers
race ordinariamente rosso scuro, o a
più fitta e più dorata che nel *plan-*

Il Sig. Alfaro ha osservato che questo *Camponotus* vive sulle Acacie spinose

(1) Il nome di *C. rubripes* essendo, non di Drury, come erron
Roger, ma di Latreille, dove cedere il posto a quello di *maculatus*

insieme alle *Pseudomyrma* ed abita le spine dei rami secchi abbandonato da queste ultime.

104. *C. Cressoni* Andr6.

Alajuela, Jiménez.

105. *C. rectangularis* n. sp.

♀ Opaca, sparsissime brevissimeque pubescens et vix pilosa, ubique confertissime punctata, pedibus et scapis subtilius punctatis, subnitidis et magis pubescentibus: testacea, vertice et abdominis basi pubescentibus, flagellis, palpis, tibiis tarsisque nigricantibus. Caput in ♀ minore subquadratum, in majore latius quam longius, antrosum angustatum et rotundatum, oculis repositis, clypeo haud carinato, lobo brevissimo, rotundato, integro, mandibulis brevibus, nitidis, sparse punctatis. Thorax dorso planato, lateribus et antice margine acuto, suturis distinctis, haud impressis, pronoto lato, angulis anticis obtusis, metanoti postice et lateribus abrupte truncati facie basali subquadrata. Abdomen squama lata, subtili, postice subplana, antice leviter convexa, supra rotundata, margine acuto. Pedes et scapi haud pilosi. Long. 4 $\frac{1}{3}$ -5 mm.

Liberia; n'ebbi poi altri esemplari di Bagaces.

Si avvicina al *C. latangulus* Rog. per la forma del capo, il colore e la scultura; per la struttura del torace rassomiglia di più al *C. tripartitus* Mayr. ma differisce da entrambi per la squama alta, sottile e tagliente.

106. *C. Alfaroii* n. sp.

♂ major. Pilosa, atra, capite antice, (cum antennis et mandibulis) late ferrugineo, coxis, articulationibus pedum tarsisque pallide testaceis, pilis erectis, albidis sparsa, tibiis et scapis pilosis. Caput breve, convexum, occipite truncato, opacum, confertissime punctatum, mandibulis brevibus, subtilissime striatis et sparse punctatis, clypeo lateribus subparallelis, antice breviter producto, haud carinato, laminis frontalibus brevibus, valde sinuatis. Antennae breves, scapo angulos capitidis haud superante. Thorax sutura pro-mesonotali distincta, meso-metanotali fortius impressa, dorso depresso, lateribus obtusissime submarginato, angulo inter metanoti faciem basalem et declivem obtuso, rotundato, minus opacus quam caput et minus confertim grossius punctatus, punctis pronoti laterum et metanoti in rugas inlistinctas confluentibus quae in metanoto subcirculariter concentrica dispositae sunt, suturis lacvibus. Abdominis squama superne depressa, lata, lateribus distincte angulata, nitida; reliqua segmenta nitida, subtilissime, transverse striolata. Long. 4-5 mm.

♀ minor. *Capite magis elongato et antrosum distinete angustato, immo convexo, atque multo subtilius et minus conseritum punctato, nitidulo, omnino nigro vel fusco, clypeo carinato, punctis thoracis magis confluentibus, rugas in pronoto irregulares, in mesonoto longitudinales, in metanoto concentricas efficientibus.* Long. $3\frac{1}{4}$ - $3\frac{3}{4}$ mm.

Alajuela.

Si avvicina al *C. circularis* Mayr, da cui differisce per la sutura meso-metanotale fortemente impressa, la scultura del torace meno rugosa, l'addome lucido e il colore del capo nella ♀ maggiore. La differenza ragguardevole della scultura del capo fra ♀ grande e piccola si ritrova in altre forme americane. 107. *C. mucronatus* n. sp.

♀ major. *Atra, opaca, mandibulis, clypeo et genis ferrugineis, antennis pedibusque rufis. Caput antice convexum, subtrapezoidicum, conseritissime, subtiliter punctatum, mandibulis subtiliter striatis et sparse punctatis, clypeo haud carinato, lateribus subparallelis, antice obsolete emarginato. Thorax dorsi margine laterali obtuso, sutura pro-mesonotali distincta, meso-metanotali impressa, metanoti superficie basali postice utrinque in dentem seu spinulum horizontalem producta, conseritum minus subtiliter punctatum, superficie metanoti declivi nitida. Abdominis squama antice convexa, postice planata, superne in dentem aculum producta, conseritissime subtiliter pungitata; reliqua segmenta similiter subtilius punctata, sculptura tamen proper pubem murinum vix agnoscenda. Pubes adpressa cuelci corporis sparsa, pili erecti longi albidi; scapi et tibiae pubescentes, haud pilosi.* Long. $5\frac{1}{2}$ -6 mm.

♀ minor. *Similiter sculpta, capite tamen antice magis angustato, engulis posticis minus rotundatis, generum et clypei margine antico tunum rufescente, hoc trapezideo, medio obtuse carinato.* Long. $4\frac{1}{3}$ mm.

Alajuela.

È prossimo ai *C. bidens* e *bispinosus*, ma ne è distinto per la forma della squama e per la scultura e pubescenza del resto dell'addome.

Mi sono limitato per ora ad una semplice enumerazione inviatomi, durante l'anno 1889, dal Sig. Alfaro, nella quale pertanto non sono comprese molte specie di determinazione finora dubbia. Dovendo più tardi completare questo elenco, coi prodotti delle ulteriori raccolte del mio solerte

corrispondente, avrà a tenero conto della distribuzione geografica ed orografica delle diverse specie, sia dentro, sia fuori dei confini della Repubblica di Costa Rica.

II.

SOPRA ALCUNE SPECIE DEL GENERE PSEUDOMYRMA.

Il genere americano *Pseudomyrma*, già per sè stesso molto difficile, a causa della grande rassomiglianza di molte specie fra loro e della variabilità notevolissima di parcochio di osso, è divenuto ancora più intricato per colpa delle possime descrizioni dello Smith. Cercherò di definire quanto meglio sia possibile lo forme di cui avrà ad occuparmi, valendomi del disegno per quello che le descrizioni non possono esprimere con sufficiente precisione.

La *Ps. gracilis* Fab. è il tipo di un gruppo di forme fra loro molto affini, di cui alcuno costituiscono razza o forse anche specie distinto. I materiali che ho d'innanzi non sono sufficienti per giudicare della costanza di questo forme, che pertanto cercherò di definire.

Ps. gracilis Fab. (i. sp.), **bicolor** Guér. Tav. V, fig. 17.

Quella forma che considero come il tipo della specie è di coloro variabile molto: talvolta è tutta nera, con le mandibole, parte dei piedi e l'inserzione del peduncolo solo più chiare, biondo o rossiccie; questa è la colorazione descritta da Fabricio, ma il colore chiaro può estendersi al pronoto ed a tutto il peduncolo e all'addomo (*Ps. dimidiata* Rog.), o anche a tutto il torace. Il peduncolo varia nella sua forma, ora più, ora meno allungato, mai molto gracile (Tav. V, fig. 17); nel profilo del primo segmento, il contorno superiore delinea posteriormente un nodo poco elevato, anch'esso variabile nella forma: anche veduto di sopra offre un aspetto vario, ora più stretto o cuneiforme, ora più grosso o rotondeggiante. Il pronoto è distintamente marginato in avanti e sui lati, però il disco è sempre debolmente convesso, e i fianchi sono assai debolmente concavi sotto il margine; gli angoli anteriori sono ottusi e per lo più fortemente ritondati. La scultura è fine, per cui il corpo è

piuttosto lucido, con pubescenza poco abbondante e sottilissima. Statura piccola 7-8 mm.

Nord del Brasile, Columbia, America centrale.

var. *mexicana* Rog. Tav. V, fig. 16.

E' notevole per la forma robusta, la scultura più forte e la pubescenza più fitta. Il torace è rosso chiaro, con una macchia nera più o meno ampia sullo scutello, la quale può invadere gran parte del torace; l'addome è per lo più nero, con peduncolo in parte rosso, i piedi di colore variabile. Lunghezza $7 \frac{1}{2}$ -9.

America centrale, Messico.

var. *sericata* Sm. Tav. V, fig. 18.

Credo interpretare rettamente la descrizione di Smith designando con questo nome una varietà australe con peduncolo mediocremente allungato, col nodo del 1° segmento più grosso e più alto che non sia in generale nella forma tipica. Il torace è robusto e il metanoto poco distintamente convesso nel senso trasversale. Il colore è piceo, con la bocca, le suture del torace, il margine dei segmenti addominali, la base del peduncolo e parte delle zampe più o meno testaccei. Talora tutto il pronoto è testaceo, macchiato di bruno sul disco.

Rio Grando do Sûl. Forme intermedio fra questa forma e il tipo furono raccolte nel Paraguay dal Balzan.

razza? *maculata* Sm. Tav. V, fig. 19.

Tra le formiche raccolte nel Brasile da van Volxem e comunicatomi parecchi anni addietro dal Museo di Bruxelles, erano due esemplari che, pel colore, sono conformi alla descrizione che Smith dà di questa forma. Uno di questi esemplari, che ebbi in cambio per la mia collezione, offre i caratteri generali di forma della *P. gracilis*, ma il suo peduncolo addominale è più breve che nelle forme precedenti e i peli ritti sono più abbondanti. Credo dovere considerare questa forma come razza o sottospecie anziché varietà.

Ps. squamifera n. st. Tav. V, fig. 20.

Forse questa forma meriterebbe di costituire una specie. La stabilisco sopra 4 esemplari di Rio Grande do Sûl (v. Jhering), notevoli per la grande statura (9-10 mm.) e per la forma del 1° segmento del peduncolo, il quale, dopo un picciuolo piuttosto lungo e sottile, si eleva bruscamente, per formare un nodo elevato che offre nel suo punto più alto, in ispecie nei più grandi esemplari, una leggiera impressione longitudinale. La forma e la scultura del capo e del torace sono come nella *P. gracilis* tipica, la pubescenza se-

riceva dell'addome più lunga e più fitta. Il colore è quello degli esemplari scuri della *P. sericata*.

Ps. agilis Sm. Tav. V, fig. 21.

Statura grande (8 1/2 mm.) scultura piuttosto forte e pubescenza abbondante, con peli ritti numerosi e lunghi. Le mandibole sono appena debolmente striate e alquanto lucide; i margini laterali del pronoto sono taglienti, sporgenti e un poco elevati, cioè separati dal disco per una leggiera depressione, gli angoli anteriori sporgenti e non rotondati, le propleure fortemente concave; anche i margini laterali del metanoto sono alquanto più acuti che non siano in generale nella *P. gracilis*. La parte stretta del 1° segmento del peduncolo è molto allungata e sottile; il 2° segmento molto distintamente più lungo che largo, piriforme. Il colore è nero, con la bocca, il peduncolo, l'addome e parte delle antenne e dei piedi anteriori testacei.

Un esemplare della prov. di Parà nel Brasile; un altro del Brasile senza indicazione più precisa.

Ps. laevigata Sm. Tav. V, fig. 22.

Questa è una forma molto distinta e che potrebbe essere considerata come specie. La statura e la forma del torace sono come nella razza precedente; il 1° segmento del peduncolo non meno allungato e il suo profilo inferiore distintamente concavo. La scultura è caratteristica: infatti la punteggiatura sottile è straordinariamente fina e quasi assente sul vertice, e la pubescenza è perciò brevissima e molto scarsa; quindi tutto l'insetto è lucido: i peli ritti sono scuri e lunghi. Le mandibole non offrono nessun vestigio di striatura, ma soltanto dei grossi punti. Il colore è giallo testaceo, col margine delle mandibole e gli occhi neri.

Due esemplari della prov. di Parà nel Brasile.

Queste due ultime forme costituiscono il passaggio alla *P. excavata* Mayr. Esse, come le precedenti, possono essere considerate come razze, sottospecie o varietà di una specie sola, vista la poca entità dei caratteri sui quali sono stabilite. I diagrammi del profilo del peduncolo gioveranno a farle meglio riconoscere.

Altre forme, benchè prossime alla *Ps. gracilis*, devono essere riguardate come specie distinte. Tali sono le *Ps. excisa* e *excavata* Mayr, nonché le due forme nuove seguenti.

Ps. mutilloides n. sp. Tav. V, fig. 23.

♀ Nigra, opaca, mandibulis testaceis, nigro-marginatis, segmento pedunculi primo rufo, pilis longis, crassioribus, fuscis aliisque subtilioribus,

albidis hirsuta, pube murina in capite tenui, in thorace et abdomen densiore, sericeo-micante vestita. Caput et thorax fere ut in P. gracili formata; oculi lumen paulo minores, clypei lobus minus productus, thorax robustior, melanoti lateribus acutius marginatis, sculptura rudior et magis conferta. Petioli segmentum 1. antice breviter petiolatum, postice nodo humili, elongato, rotundato, 2. pyriforme, vel subconicum, latitudine sua maxima haud longius. Long. 11 mm.

Prov. di Bahia nel Brasile, un esemplare.

Questa bellissima specie para non essero stata descritta dallo Smith; almeno io non so trovaro nessuna descrizione che le convenga. La statuta ragguardevole e i peli ritti numerosi, combinati con una pubescenza fitta, che cela quasi la scultura dell'addome, danno a questa forma un abito tutto particolare.

Ps. nigropilosa n. sp. Tav. V, fig. 24.

♀ Testacea, vertice, melanoto medio, flagellis, coxis femoribusque magis minusve fuscatis, opaca, creberrime punctata et dense flavidio-pubescentia, pilis longis, nigris parce hirsuta. Caput minus latum quam in P. gracili, postice minus late truncatum, lobo clypei angustiore et magis producto, margine antico magis arcuato, antennarum flagelli articulis paulo brevioribus. Thorax inter mesonotum et melanotum profundius impressum quam in P. gracili, melanoto breviore et magis gibboso. Abdominis pedunculi segmentum 1. antice brevissime petiolatum, supra nodo allo, longiore quam latiore; segmentum 2. latitudine sua maxima acquilongum. Long. 6 mm.

Liberia (Costa Rica) duo esemplari.

Ps. Künckeli n. sp. Tav. VI, fig. 5.

♀ Ruso-testacea, femoribus abdomineque brunnescens, nitidula, pilosa et pubescentia, pube in thorace et abdomen minus tenui, hoc sericeo. Caput latum, anterius angustatum, genis confertim, vertice parce subtilissime punctatis, oculis haud magnis, clypeo antice haud producto; mutico, carinula media brevi, mandibulis striatulis, nitidis. Antennae articulo flagelli 1. sequente parum longiore, 2-5 vix longioribus quam crassioribus. Thorax dorso depresso, lato, post mesonotum haud distincte impresso, pronoli dorso depresso, utrinque obtuse submarginato, lateribus abruptis, melanoto superne planato, lateribus posticeque truncato. Abdominis segmentum petiolare 1. antice brevissime pedunculatum, postice nodo trapezoidico,

latiore quam longiore, subitus carinatum; segm. 2. cupuliforme, latius quam longius, postice parum constrictum. Long. 5 1/2 6 mm.

♀ *Lacte rufo-testacea, scutello obscuriore, abdomine plerumque fusco, rarius concolore, nitidissima, pilosa, sed vix pubescentia, abdomine haud sericeo, pedunculo abdominalis haud crassiore quam in operaria, huic cæterum propter structuram capitinis, antennarum et pedunculi similis. Alae leviter fumatae, costis et stigmate fuscis.* Long. 6-6 1/2 mm.

Alajuela (Costa Rica): nidi nel legno.

È notevole per la forma breve e robusta, il capo largo, con gli occhi relativamente piccoli, il peduncolo breve col primo segmento avendo la faccia antero-superiore appena concava sul profilo e munito di un nodo trapezoidale ben più largo che lungo; per quest'ultimo carattere, si avvicina alla *P. latinoda* Mayr, da cui differisce per la forma del capo e gli articoli del flagello meno grossi. Dedico questa specie al Sig. J. Künckel d'Herculais del Museo di Parigi.

Ps. Belti n. sp. Tav. VII, fig. 1.

♀ *Nigra, mandibulis, margine oris, antennis, articulationibus pedum tarsisque rufescens, opaca, capite, thorace et segmento pedunculi primo confertissime minus subtiliter punctatis, reliquo abdominali subtilissime punctato, pube adpressa, grisea, sericeo micante; pili erecti, pauci, albidi. Caput ovalum, oculis minus quam dimidiam partem laterum occupantibus, clypeo in lobum obtuse truncatum producto. Antennae articulo flagelli 2. lum crasso quam longo, sequentibus sensim crassioribus, penultimis transversis. Thorax pronoto haud marginato, mesonoto elevato, sutura meso-metanotali modice impressa, metanoto transversim convexo, angulo posteriore dorsi obtuso, rotundato, hoc segmento, præter sculpturam reliqui thoracis, adhuc sive colis discretis, majoribus impresso. Abdominis segmentum petiolare 1. antice breviter petiolatum, inde superne nodo elongato, ultrinque subangulato, infra, antice denticulo acuto instructum, metanoti instar punctatum et sive colatum; segmentum 2. transversum, ovatum. Long. 5-6 mm.*

♀ *Operariae quoad sculpturam fere similis, capite magis elongato, mesonoto subnito, parcus punctato. Long. 8-10 mm. Alae fuscatae, nervis fuscis.*

Alajuela, Jiménez, Liberia (Costa Rica) nelle spine delle Acacie.

È caratterizzata soprattutto dalla forma del peduncolo e dalla scultura del metanoto. Dedico la specie all'eccezionale scopritore delle relazioni simbiotiche delle Pseudomirme con le Acacie.

razza *fulvescens* n. st.

Una forma molto assino che considero come razza geografica della precedente mi fu mandata dal Prof. Beccari, che la rinvenne nei rigonfiamenti di esemplari della *Cordia gerascanhos*, provenienti dal Guatemala. Differisce pel colore rosso testaceo, con l'addome bruno, pel mesonoto poco meno elevato, sicché tutto il dorso del torace è più piano e per i peli meno numerosi; però la scultura è identica a quella della forma nera. Le ali della ♀ sono di colore più chiaro, con le nervature bionde. Il Sig. Mayr mi scrive di averla ricevuta dal Messico. Una varietà molto rassomigliante a questa, raccolta dal Dott. Stoll nel Guatemala, mi è stata mandata dal Prof. Forel.

Ps. *spinicola* n. sp. Tav. VI, fig. 2.

♀ *Ferrugineo-testacea, femorum parte media abdominisque apice plurimique obscurioribus, opaca, pilosa, abdomine sericeo-micante. Caput modice elongatum, oculis mediocribus, consertissime, profunde punctatum, fronte medio elevata, clypeo antice cum lobo lato, brevissimo, apice arcuatum emarginato, utrinque dentato. Antennarum flagelli articuli 2-5 haud longiores seu vix longiores quam crassiores. Thorax sculptura subtiliore et minus profunda, ideoque minus opacus quam caput, dorso subrecto, pronoto haud marginato, mesonoto parum elevato, melanoti angulo dorsali postico obtuso, facie declivi valde obliqua, facie dorsali longa, haud planata. Abdominis pedunculi segmentum 1. antice petiolatum, postice superu nodo humili, elongato; 2. paulo latius quam longius. Long. 4-5 $\frac{1}{2}$ mm.*

♀ *Sculptura, clypeus et pectiolus sere ut in operaria; caput multo magis elongatum, lateribus parallelis; mesonotum parcus punctatum, subnitidum; color plerumque obscurior, fronte, mesonoto et melanoto fuscescentibus. Alae fumatae, costis fuscis, stigmate piceo. Long. 7-8 $\frac{1}{2}$ mm.*

Alajuela, Jiménez (Costa Rica); nelle spine delle Acacie.

Questa specie è agevolmente riconoscibile dalla forma del clipeo e dalla fronte che porta nel mezzo una elevazione longitudinale formata da due cercini lineari che prolungano in certo modo le lame frontali e comprendono fra loro un solco poco profondo; questo si prolunga fino all'occhio impari, mentre i due cercini si abbassano e spariscono molto prima.

Ps. *nigrocineta* n. sp. Tav. VI, fig. 3.

♀ *Flava, abdominis segmento 3º (1º post pedunculum) basi fusco-fusciato, sive bimaculato, capite thoraceque creberrime subtiliter punctatis, opacis, abdomine nitidulo, parcus punctato. Caput modice elongatum, lateribus arcuatis, oculis mediocribus, clypei lobo rotundato, vel obtuse trun-*

calulo. Antennarum flagelli articulus basalis sequentibus duobus una sub-
sequulis, his vix brevioribus quam crassioribus. Thorax dorso subrecto,
pronoto hanc marginato, mesonoto rotundato, hanc elevata, ante metu-
notum impressione brevi, profunda, metanoto superne vix planata, postice
angustiore, angulo inter dorsum et faciem declivem obtuso, rotundato. Ab-
dominis segmentum pedunculare 1. linea dorsi antice subrecta vel vix sub-
concava, dorso aliquantulum planata, lateribus tamen hanc marginata,
latitudine maxima circiter duplo longiore. Long. 4-4 $\frac{2}{3}$ mm.

♀ Color operariae, tamen fascia abdominis latoire et fere nigra, ver-
tice, pronoto postice, mesonoti lateribus et femoribus posticis brunneo-ma-
culatis. Sculptura ut in ♀, mesonoto tamen punctis majoribus, multo mi-
nus crebris, scutello sublaevi, nitido. Caput magis elongatum, lateribus
minus arcuatis. Alae leviter fuscatae, stigmate fusco. Long. 6-6 $\frac{1}{2}$ mm.

Alajuela, Jiménez (Costa Rica); nelle spine delle Acacie.

Pel colore e la grandezza, ricorda la *P. flavidula* Sm. da cui è ben di-
stinta per la punteggiatura fitta del capo, e per l'impressione profonda del
torace; in alcuni esemplari, il profilo dorsale del 1° segmento del peduncolo
è leggermente concavo nella sua parte anteriore: però questa forma del pe-
duncolo si osserva pure, benchè di rado nella *P. flavidula*. (Tav. VI, fig. 4).

Ps. subtilissima n. sp. Tav. VI, fig. 7.

♂ Testacea, meso et metathorace atque femoribus posticis obscurioribus,
abdominis segmenti 3. (1. post pedunculum) dimidio basali et segmentis
sequentibus fuscis, opaca, confertissime et subtilissime punctata, pube sub-
tili, albida, sericeo-micans, pilis erectis vix ullis. Caput lateribus paral-
lelis, latitudine sua maxima (cum mandibulis) fere duplo longiore, postice
truncatum, oculis permagnis, oratis, laminis frontalibus longis, clypeo cum
lobo angusto, porrecto. Thorax angustus, dorso subrecto, sutura meso-
melanotali vix impressa, metanoto postice angustato, abrupte truncato et
leviter excavato. Abdominis petioli segmentum 1. modice elongatum, dorso
longiorsum convexo; 2. latitudine maxima vix brevius. Long. 3-3 $\frac{1}{2}$ mm.

♀ Operariae simillima et paulo major, capite magis elongato, plus
duplo longiore quam latoire: alae desunt. Long. 4 $\frac{1}{4}$ mm.

Alajuela: in alcune spine di un albero di acacia abitato dalla *P. Belti*.

Si avvicina alla *P. sericea* Mayr da cui differisce, non solo pel colore,
ma sopra tutto per la forma più gracile e allungata, il capo molto più stretto
e gli occhi proporzionalmente meno grandi (veggasi Tav. VI, fig. 6).

Ps. denticollis n. sp. Tav. V, fig. 26.

♀ *Ferruginea, abdomine plerumque rufescente, apice fuso, pedibus anterioribus mandibulisque pallidioribus, opaca, confertissime rugose punctata, pube microscopica pruinosa, abdomine minus opaco, subtilius punctato et densius pubescente, pilis erectis fere destituta. Caput longitudine sua fere aequilatum, postice leviter angustatum, mandibulis striolatis, clypeo cum lobo angulatim exciso. Antennarum flagelli articulus 2. praecedente parum brevior, crassitie sua tertia parte circiter longiore. Thorax dorso haud impresso, pronoto utrinque acute marginali, angulis anticis in denticulum obtusum distincte productis, melanoto praeter sculpturam communem foveolibus superficialibus, scutam microscopicam gerentibus sculpto, angulo inter faciem basalem et declivem distincto, obtuso. Abdominis pedunculi segmentum 1. a latere visum basi breviter concavum, inde convexum, supra deplanatum, marginibus acutis, subtus antice dente acuto; secundum transversum, antice conicum, postice rotundatum. Pedes sine pilis erectis. Long. 6-7 mm.*

Asuncion del Paraguay, raccolta dal Prof. Balzan.

È prossima alla *P. elegans* Sm., da cui differisce pel colore, pel 1° segmento del peduncolo un poco meno stretto, con profilo dorsale alquanto convesso nella sua parte anteriore, soprattutto per la forma del pronoto che più largo, con gli angoli anteriori sporgenti, in modo da formare un piccolo dente, dietro il quale il margine laterale è distintamente sinuato. Si confronti la fig. 26 con la 25 che rappresenta il torace della *P. elegans*.

Le *P. elegans*, *denticollis*, *mutica*, *pallens* e *temuis* costituiscono un gruppo naturale, caratterizzato dal 1° segmento del peduncolo che ha una superficie dorsale spianata, o concava con margini laterali distinti, dal dorso del torace non inciso, e dalla mancanza di peli ritti sulle zampe.

Non ho descritto ♂ di Pseudomirme; conosco quelli delle *Ps. Künckeli*, *Belti*, *spinicola*, *nigrocineta* e *mutica*, i quali offrono tra loro notevoli differenze. Ho figurato il capo delle 4 prime specie, ma ho preferito di aspettare per descriverli di poterli confrontare con un maggior numero di forme, onde meglio rilevarne i caratteri differenziali.

III.

NUOVE FORME AMERICANE
DEI GENERI STRUMIGENYS E EPITRITUS

L'interessante e curioso genere *Strumigenys* è stato arricchito recentemente dal Mayr di molte forme americane nuove, di cui l'autore dà eccellenti descrizioni e riassume i caratteri in un quadro analitico molto ben fatto di tutte le specie a lui note. Pertanto l'esperienza mi ha provato che, se quadri così fatti sono utilissimi e rendono molto agevole la determinazione delle specie, quando sono completi o quasi completi, lasciano spesso sussistere molti dubbi, quando il numero delle specie ignote all'autore è considerevole. Chi ha nelle mani una forma nuova si trova spesso nell'incertezza se sia talo oppur no. A sciogliere questi dubbi, specialmente quando si tratta di animali aventi forme così spiccate come i Criptoceridi, valgono molto lo studio e per ciò ho creduto utile disegnare il capo non delle sole forme nuove, ma di tutte le specie americane di cui ho potuto avere esemplari tipici o sicuramente determinati. (Veggasi Tav. VII, fig. 1-11, Tav. VIII, fig. 1-6.)

Strumigenys Smithi Forel, var. *Inaequalis*, n. var. Tav. VII, fig. 3.

Un esemplare del Matto Grosso differisce dalla forma tipica di S. Catharina mandatami dal Forel, per le mandibole alquanto più lunghe e sottili, in cui i due denti o spine del margine interno sono più deboli e fra loro ineguali, essendo l'antiorio più breve del posteriore.

S. *unispinulosa* n. sp. Tav. VII, fig. 5.

♀ Testacea, opaca, capite toraceque creberrime subtiliter, abdome subtilissime reticulato-punctatis, hoc basi striatulo. Caput breviter cordiforme, mandibulis ipso brevioribus, basi approximatis, subparallelis, apice dentibus spiniformis duobus (infero bifido) et spinula altera ante apicem brevissima, clypeo antice truncato. Antennae scapo subrecto, angusto, flagelli articulis 2-3 brevioribus quam crassioribus, apicali reliquo flagello parum longiore. Thorax sutura meso-metanotali distincta, vix impressa, spinis metanoli majusculis, basi sine membrana spongiosa. Pedunculi ab-

dominis segmentum 1. sine membranis; 2. transversum, subtus et margine postico cum limbo membranaceo. Corpus totum pilis longis, clavatis obsitum, caput etiam setulis squamiformibus. Long. (cum mandibulis) 2 mm.

♀ Operariac simillima, tamen scapis et mandibulis crassioribus et paulo brevioribus, metanoti spinis apice minus acutis. Alae hyalinae. Long. 2 $\frac{1}{4}$ mm.

Alajuela (Costa Rica).

Si avvicina molto alla *S. unidentata* Mayr (Tav. VII, fig. 4) alla quale si giunge seguendo la tabella analitica del Mayr; ne differisce per il capo più robusto, meno stretto in avanti, per le mandibole proporzionalmente meno lunghe, più robuste e più dritte, i cui denti apicali formano con lo stipite un angolo meglio marcato; per la scultura dell'addome. Il capo e il torace hanno una scultura reticolata fittissima; la stessa scultura è meno fitta ma più sottile e meno regolare sui nodi del peduncolo e sull'addome propriamente detto che sono egualmente opachi, questo ha inoltre, alla base, una sottile striatura longitudinale.

S. Rogeri n. sp. Tav. VII, fig. 6.

S. (Pyramica) Gundlachi Rog. ♀ (?) nec ♀.

♀ Testacea, opaca, pilis clavatis parce obsita, subtiliter confertissime reticulato-punctata, abdomine lacvi, nitido, segmento 3. basi striatulo. Caput subcordiforme, antrorsum valde angustatum, postice profunde arcuatum excavatum, margine scrobis infero ante oculos convexos inciso, clypeo parvo, antice arcuato, mandibulis elongatis, angustis, basi approximatis, apice dentibus duobus, supero spiniformi, maximo, infero breviore, obtuso, bisido, ante apicem denticulis duobus subaequalibus. Antennae graciles, scapo subrecto, medio leviter incrassato, articulo flagelli 4. praecedentibus duobus una subaequali, ultimo praecedentium summa longiore. Thorax metanoti bidentati dentibus infra in carinulas membranaceas productis. Nodus petioli 2. postice et infra cum membranis spongiosis, 1. hisce membranis destituto. Long. 1 $\frac{2}{3}$ mm.

Antille, S. Tommaso, un esemplare.

Ritengo che questa sia la ♀ della forma descritta dal Rogor come ♀ della sua *Strumigenys Gundlachi*, la quale appartiene certamente a specie diversa dalla *S. Gundlachi* ♀. Adoperando la tabella analitica del Mayr, si giunge alla *S. salicens*, da cui la nuova specie differisce moltissimo, cioè per la piccola statura, per le mandibole più sottili, i cui denti preapicali sono più avvicinati all'estremità, il capo più cordiforme, col margine inferiore della fossa

antennale inciso innanzi all'occhio (carattere singolare che non ho riscontrato in nessun'altra specie), l'ultimo articolo delle antenne proporzionalmente molto più lungo e il 1° segmento del peduncolo privo di membrane.

S. Eggersi n. sp. Tav. VII, fig. 9.

♀ *Testacea, pilis clavatis, parcis instructa, opaca, capite thoraceque profundius, abdomine magis superficialiter crenatissime reticulato-punctatis. Caput breviusculum, postice profunde excaratum, mandibulis capite distinete brevioribus, basi distantibus, subrectis, apicem versus sensim attenuatus, ibique in dentes 2. introrsum curvatos desinentibus, margine interno ante apicem denticulis minutissimis 6-7 armato, antennis gracilibus, articulo ultimo reliquo flagello multo longiore. Thorax dorso convexo, sutura pro-mesonotali obsoleta, meso-metanotali distincta, metanoto utrinque dente valido, acutissimo. Abdominis pedunculus membranis destitutus, nodo 2. praecedente multo crassiore, transverso. Long. 1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{3}$ mm.*

♀ *Operariae similis, mandibulis paulo brevioribus et spinis thoracis basi crassioribus. Long. 1 $\frac{2}{3}$ -1 $\frac{3}{4}$ mm.*

Isola di S. Tommaso, raccolta dal Barone Eggers. Si avvicina molto alla *S. denticulata* Mayr, ma ne differisce principalmente per la forma delle mandibole che sono più brevi e quasi dritte, nel 2° nodo del peduncolo più largo e per la scultura dell'addome.

S. membranifera Em. razza simillima n. st. Tav. VIII, fig. 5.

♀ *S. membranifera stirpi typicae (ex Neapoli) proxima et capite paulo magis elongato, antrorsum magis angustato, in linea mediana post clypeum distinctius impresso et antennarum flagello magis elongato, articulo ultimo praeecedentibus una distinete longiore vix agnoscenda. Long. 1 $\frac{1}{2}$ mm.*

Isola di S. Tommaso, un esemplare.

Confesso che se questo esemplare fosse europeo, non avrei attribuito nessun valore ai caratteri veramente insignificanti che lo fanno differire dallo esemplare tipico napoletano (finora unico) della mia collezione e che si potranno rilevare dal confronto delle mie figure 4 e 5 (Tav. VIII). Le due forme differiscono molto da tutte le congeneri per la forma del clipeo che, avanzandosi pure sulla base delle mandibole, è troncato quasi in linea retta in avanti, senza formare quel lobo rotondato che si osserva nelle *S. Friederici Mälleri*, *clypeata*, *ornata* e *Baudueri*; per la struttura delle mandibole molto brevi e aventi, poco in avanti del margine del clipeo, un margine tagliente trasverso che limita indietro una parte anteriore più elevata della superficie dorsale delle mandibole stesse. Queste condizioni di forma sono rese

esattamente nella mia figura in Annali del Mus. Civico di Genova (VII, p. 474), mentre la figura di tutto l'insetto negli Annali dell'Accad. d. Aspiranti Naturalisti di Napoli è difettosa, in quanto riguarda il clipeo e le mandibole.

Epitritus Emmae n. sp. tav. VIII, fig. 6.

♀ *Testacea, opaca, consertissime punctata, capite thoraceque pilis clavato-squamiformibus, abdomine pilis simpliciter clavatis. Caput breviter cordiforme, clypeo brevi, lato, mandibulis basi approximatis, valde arcuatiss, apice dentibus spiniformibus duobus, ante apicem spina altera longa, subtili. Antennae scapo dilatato, basi subtiliore, arcuato, articulo flagelli secundo minimo, ultimo scapo parum breviore. Thorax disco pro-mesonotali planato, sutura pro-mesonotuli nulla, meso-melanotali leviter impressa, melanoto postice, utrinque denticulo minuto et margine membranacco. Abdominis segmentum petiolare 1.^o antice breviter pedunculatum, postice nodo tam crasso quam longo, 2.^{um} brevius et latius, transversum, hoc lateribus, illo infra membranaceis; segmenta reliqua nitida, tertium basi breviter striolatum. Long. 1 1/4 mm.*

Isola di S. Tommaso, un esemplare. Dedico questa elegante specie alla Signora Emma Forel.

IV.

GLYPTOMYRMEX UNGINATUS Mayr

Dovo al Prof. Balzan la conoscenza dei tre sessi della formica descritta dal Mayr, col nome di *Apterosigma uncinatum*, sopra un esemplare ♀ di S. Catharina. I miei esemplari provengono dai dintorni di Asuncion nel Paraguay. La ♀ corrisponde bene alla descrizione del Mayr ed è stata confrontata gentilmente dall'autore con l'esemplare tipico; soltanto è più piccola (2 1/5-3 mm.); noto sotto il protorace, in avanti dello anche anteriori, un dente acuto non menzionato dal Mayr, il quale corrisponde al dente inferiore dello Atte o dei *Cyphomyrmex*. — Nella ♀, la statura è più robusta, il poduncolo addominale più grosso, col 2^o segmento molto più largo che lungo; il protorace ha i margini laterali rialzati, prolungati alle loro estremità anteriore e posteriore in un dente piatto e irregolare ed ha, come nella ♀, un dente spiniforme inferiore, verso l'articolazione dell'anca. Il me-

sonato è debolmente solcato nel mezzo; lo scutello bidentato; il metanoto ornato di spine o denti acutissimi. Lungh. 3 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{3}{4}$ mm.

Il ♂ offre la struttura del capo e del torace descritta dal Forel pel genere *Glyptomyrmex*, e non saprei dire di certo se sia propriamente questa specie descritta da lui col nome di *G. dilaceratus*, alla quale rassomiglia molto. È però più piccolo (3 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{2}{3}$ mm.). Per quanto la descrizione del Forel sia lunga e particolareggiata, essa non esclude molti dubbi che soltanto una figura esatta potrebbe risolvere. Riservandomi di ristudiare più tardi l'argomento, mi limito a dire che posseggo 3 altri ♂ di *Glyptomyrmex* di diverse provenienze, i quali offrono differenze notevoli, nella grandezza, nel colore delle ali, nella forma della cella radiale e nella forma del peduncolo addominale. Il ♂ del *G. uncinatus* è distinto per la forma breve della cella radiale, meno di una volta e mezzo lunga quanto è larga, pel colore delle ali non molto scuro e pel 1º segmento del peduncolo non molto allungato, col nodo poco ispessito.

V.

NOTE SOPRA ALCUNE SPECIE DI CRYPTOCERUS.

Le forme singolari e varie del genere *Cryptocerus*, particolarmente a cagione dello spinoso e altre appendici del loro torace, si prestano meglio ad essere definito mediante figuro che mediante descrizioni, le quali ultime, per essere accurate, divengono di necessità molto lunghe. Se le numerose figure dato dallo Smith nei suoi lavori sui Criptoceridi fossero esatte, avremmo in quelli scritti una importantissima illustrazione di questo gruppo; sventuratamente il maggior numero di quei disegni sono vere caricature (non sempre rassomiglianti) degl'insetti ai quali dovrebbero riferirsi; sovente non sono meno difficili ad interpretare dello stesso brévissimo descrizioni. — Nel pubblicare nelle pagine che segnano alcune osservazioni sinonimiche e descrizioni di specie nuove, ho creduto rendere un servizio agli entomologi signando le forme che sono oggetto del lavoro; così potranno essere facilmente riconosciute da altri e, se avrà commesso errori di determinazione, sarà facile a chi possiede tipi autentici rilevarli e correggerli. In molte specie hayvi due forme di ♀, talvolta differentissime, tra le quali però non mancano forme intermedio; in altre sembra esistere una sola forma che varia poco (*atratus*, *oculatus*, *cordatus*). Dove ho potuto, ho figurato le ♀ grande e piccola e la ♀.

processus terminante, melanoli margine laterali membranoso, ulrinque obtuse angulato, sine processu subspiniformi; nodi spinosi, femora angulata. Long. $6\frac{1}{2}$ –8 mm.

♀ minor. *Majori similis, sed tota opaca, lateribus capitis subrectis, convergentibus, marginibus minus elevalis, pallidioribus, angulis posticis oblique subtruncatis, tuberculis capitis minimis, pronoti carina obsolda vel nulla.* L. $5\frac{1}{2}$ mm. *Operariae mediae habent sculpturam minoris, dum tuberculis occipitis et carina pronoti majoribus similliores apparent.*

♀ Color et sculptura sere ♀ majoris. Caput antrorsum magis angustatum, lateribus minus elevalis, punctis majoribus. Thorax pronoto carinato utrinque in processum truncatum producto, metanoto ulrinque obtuse proeminenti, postice excavato, superficie concava opaca. Abdomen punctis sparsis minutissimis. L. 10 mm.

Jiménez (Costa Rica).

Differisce dalla forma tipica per gli angoli del capo più ottusi, i suoi lati maggiormente convergenti in avanti nella ♀ maj. e pel margine del metanoto che forma in ciascun lato un angolo molto ottuso e più o meno rotondato e non un processo quasi spiniforme.

Cr. minutus Fab. Syst. Piez. p. 420. Klug. Ent. Monogr. p. 203 etc. ♀ minor.

Smith. Cat. Br. Mus. Pl. XII, fig. 3, ♀ minor (?); Trans. Ent. Soc. London (3). Vol. I. Pl. IV, fig. 6 ♀ major.

C. quadrimaculatus Klug. l. c. p. 215 ♀.

Smith. Journ. Entom. Vol. I, p. 74; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) Vol. I. Pl. IV, fig. 2 ♀ maj.

Formica caustica Kollar in Pohl. u. Kollar. Brasiliens lästige Insekten p. 17, fig. 12 ♀ min.

C. Volkemi Em. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 6 Janvier 1878 ♀ minor.

La descrizione data dallo Smith della ♀ del *C. quadrimaculatus* sembrami doversi riferire senza dubbio al *C. minutus*, e così pure la figura, la quale ritrae più fedelmente le sembianze del *C. minutus* che non facciano le figure che, nel Cat. Brit. Mus. e nella List of Cryptoceridae (1862), dovrebbero rappresentare quest'ultima specie. La nota leggerezza con la quale lo Smith descriveva le sue specie ci dà ragione del fatto che egli non si sia accorto della identità delle due forme. — Allo stesso modo egli descrisse, nella citata List of Cryptoceridae, la ♀ del *C. elongatus* Kl. senza riconoscere che dessa è (come è ben noto) il *C. pusillus*. Chi voglia confrontare la ♀ major del *C. minutus* con la femmina nota col nome di *quadrimacu-*

tatus non tarderà a convincersi che le due forme appartengono ad una stessa specie o che (prescindendo dallo macchio dell'addome) le differenze nella forma del capo, del torace e del peduncolo non sono maggiori di quelle che osservansi nelle forme affini (ad es. nello stesso *pusillus*). Si riscontrino in proposito le mie figure Tav. IX, fig. 7 a, b, c, d.

Nel *Cryptocerus pusillus* è notevole la variabilità delle spine del torace nella ♀ *minor*, variabilità irregolare e non localizzata, che non può dar luogo alla istituzione di razze geografiche (v. fig. 8 a, b, c, d).

Cr. cordatus Sm.

razza *multispinus* n. st., *an species distinguenda?* Tav. IX, fig. 5.

Ho d'innanzi parecchi esemplari di diverse località di Costa Rica, i quali differiscono dalla descrizione di Smith per la presenza di tre spine invece di due in ogni lato del metanoto; in qualche esemplare, notasi inoltre alla base dei lati di questo segmento un piccolo dente, come accenno di una quarta spina. Gli angoli posteriori del capo hanno pure forma differente da quella della figura di Smith. A questa specie si avvicina molto il

Cr. complanatus Guér. *femoralis* Sm.

del quale credo utile dare una esatta figura, secondo un esemplare peruviano della mia collezione. Tav. IX, fig. 6.

Cr. Pinelli Guér.

C. grandinosus Sm.

La figura di Smith è buona, mi sembra non lasciare dubbio in ciò molto diffusa e di colore ir-
pace al testaceo, coi margini del capo, del torace, delle spine peduncolari e del disco addominale membranacei, pellucidi, bianchicci; spesso l'addome è più chiaro alla poriferia, scuro al centro. La ♀ *major* e la ♀ sono finora inedite: gli esemplari di cui do la figura (Tav. IX, fig. 10) provengono da Rio Grande do Sul (v. Jhering). Le differenze di forma, molto rilevanti, saranno spiegate molto meglio dalle figure che da lunghe descrizioni. È notevole la forma del capo (identica nella ♀ maj. e nella ♀) che porta un disco concavo con margine crenulato, il quale è ornato al suo orlo posteriore di una fossetta rotonda, circondata da margine rilevato. Nella ♀, non esistono margini membranacei; nella ♀ maj., si trovano solo all'orlo posteriore laterale del metanoto e alle spine del peduncolo. Il colore è scuro, con i margini del capo, il pronoto, o almeno la porzione che sta in avanti della carena e il metanoto più o meno ferruginei o testacei. Il bordo chiaro dell'addome è

più o meno distintamente partito in 4 macchie nella ♀ maj., ancora più nettamente nella ♀.

Il *Cr. scutulatus* Sm. rassomiglia alla ♀ maj. di questa specie, ma sembra differirne per l'assenza della fossetta posteriore del capo e per le spine del peduncolo senza apice membranoso. Probabilmente si riferisce alla specie seguente:

Cr. angulosus Sm. Trans. Soc. Ent. London 1867 p. 525, Pl. XXVI, fig. 7
♀ minor.

Il *Cr. jucundus* Sm. ibid. 1876 p. 606, Pl. 11, fig. 2, mi sembra identico al *C. angulosus*: entrambi sono descritti sopra esemplari messicani. Io ho ricevuto questa specie da Costa Rica (Tav. IX, fig. 9); conosco solo la ♀ minor; in alcuni esemplari, le due macchie basali dell'addome sono più estese e si osserva una traccia di macchie posteriori, la qual cosa, aggiunta alla evidente affinità col *Cr. Pinelii* dà ragione di supporre che la ♀ maj. e la ♀ hanno il capo munito di disco e l'addome con 4 macchie.

Cr. Alfaroii n. sp.

♀ Atra, capite thoraceque magis minusve subopacis, abdomen nitido. Caput disco cum lateribus subparallelis, antice emarginato ibique utrinque rotundato, margine laterali elevato, crenato, posicce utrinque bispinoso, vertice bituberculato, in ♀ minore opaco, consertissime longitudinaliter ruguloso-punctato et punctis foveiformibus squamuligeris impresso, in ♀ majore nitidulo, subtilissime punctato, punctis squamuligeris majoribus. Thorax pronoto utrinque spinoso, spina antice denticulo armata, inter spinas carina elevata, transversa, acuta, medio acute bidentata, in ♀ minore minus conspicua, sutura meso-metanotali impressa, metanoto bispinoso; sculptura thoracis fere ut capitis. Abdominis pedunculus opacus, rugosus et creberrime punctatus, segmento 1° supra spinulis 2 suberectis; 2° spinulis crassiusculis; segmenta sequentia nitida, subtilissime superficialiter reticulato-punctata, punctis foveiformis, setuligeris, sparsis. Long. 8-11 mm.

Alajuela (Costa Rica). Questa bellissima specie si avvicina moltissimo per la struttura generale al *C. atratus* da cui è però facile a distinguere per i caratteri seguenti: Il disco del capo è più parallelo, coi margini più alti, più forte mente crenati, con l'incavo anteriore più stretto; il vertice ha due denti acuti, appena accennati come tubercoli ottusi nel *C. atratus*. Il torace ha, tra le spine anteriori, una cresta tagliente, più elevata nei grandi esemplari, e sulla quale s'innalzano nel mezzo due denti forti e acuti; di

questa struttura si trova appena un vestigio nei più grandi esemplari del *C. atratus*. Le spine anteriori sono munite in avanti di un dente più marcato che non sia in generale nel *C. atratus*; nei grandi esemplari esse sono più brevi che in questa specie, mentre le spine del metanoto sono più robuste e più scabre. I due segmenti del peduncolo sono armati ciascuno di un paio di spinette oblique, rappresentate nel *C. atr.* da tubercoli ottusi. Infine la scultura è molto diversa; soprattutto nei piccoli esemplari. — Il *Cr. Alfaroii* mostra fra ♀ grande e piccola delle differenze di scultura analoghe a quelle che si osservano in parecchie altre specie e che mancano nel *Cr. atratus*.

I *Cr. atratus*, *Alfaroii* e *oculatus* costituiscono un gruppo naturale, non solo per la forma esterna, ma ancora per la struttura microscopica del gigerio, i cui peli ramosi sono più lunghi e più sviluppati che nelle altre forme del genere.

SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

TAVOLA V.

- Fig. 1. Capo dell'*Odontomachus haematodes*, var. (?) *microcephalus* Em.
» 2. — — *O. chelifer* var. (?) *leptocephalus* Em.
» 3. — del *Megalomyrmex Foreli* Em. { a destra è disegnata la
» 4. — — *M. Latreillei* Em. } scultura della fossa antennale.
» 5. — — *M. leoninus* For.
» 6. Profilo dell'*Aphaenogaster phalangium* Em. ♂.
» 7. — — *A. phalangium* ♀.
» 8. — — *A. araneoides* Em. ♀.
» 9. *Pheidole absurda* For. soldato.
» 10. Esemplare della stessa specie intermedio fra soldato e femmina.
» 11. Parte anteriore del medesimo maggiormente ingrandito.
» 12. { Capo della *Pheidole subarmata* Mayr., soldato, di profilo e di prospetto.
» 13. {
» 14. { Capo della *Ph. cornutula* Em., soldato, di profilo e di prospetto.
» 15. {
» 16. Peduncolo della *Pseudomyrma gracilis* var. *mexicana* Rog. & Costa Rica.
» 17. — — — *Ps. gracilis* tipo, esemplare della Nuova Granada con peduncolo mediocremente allungato.
» 18. — — — *Ps. gracilis* var. *sericata* Sm. di Rio Grande.
» 19. — — — *Ps. gracilis* razza *maculata* Sm.
» 20. — — — — — *squamifera* Em.
» 21. — — — — — *agilis* Sm.
» 22. — — — — — *laevigata* Sm.
» 23. — — — *Ps. mutilloides* Em.
» 24. — — — *Ps. nigropilosa* Em.
» 25. Torace della *Ps. elegans* Sm.
» 26. — — — *Ps. denticollis* Em.

TAVOLA VI.

- Fig. 1. *Pseudomyrma Belti* Em. forma tipica.
» 2. *Ps. spinicola* Em.
» 3. *Ps. nigrocincta* Em.
» 4. *Ps. flavidula* Sm.: esemplare del Venezuela col contorno dorsale del 1º segmento del peduncolo distintamente concavo nella metà basale.
» 5. *Ps. Künckeli* Em.
» 6. *Ps. sericea* Mayr, esemplare di Costa Rica.
» 7. *Ps. subtilissima* Em.

Per tutte le figure valgono le lettere seguenti: *a*, ♀ di profilo; *b*, capo della medesima; *c*, antenna fortemente ingrandita; *d*, peduncolo veduto dal dorso; *e*, capo della ♀; *f*, capo del ♂.

TAVOLA VII.

- Fig. 1. Capo della *Strumigenys saliens* Mayr.

- » 2. — — *S. Smithi* For., esemplare ti na.
» 3. — — *S. Smithi*, var. *inaequalis* F rosso.
» 4. — — *S. unidentata* Mayr.
» 5. — — *S. unispinulosa* Em.
» 6. — — *S. Rogeri* Em.
» 7. — — *S. imitator* Mayr.
» 8. — — *S. denticulata* Mayr.
» 9. — — *S. Eggersi* Em.
» 10. — — *S. crassicornis* Mayr.
» 11. — — *S. subdentata* Mayr.

TAVOLA VIII.

- Fig. 1. Capo della *Strumigenys Friderici Müller* For.

- » 2. — — *S. ornata* Mayr.
» 3. — — *S. clypeata* Rog.
» 4. — — *S. membranifera* Em., tipo di Napoli.
» 5. — — — razza *simillima* Em. di S. Tommaso.
» 6. — — *Epitritus Emmae* Em.

Fig. 7. *Cryptocerus Pavonii* Latr. ♀ minor.

- » 8. — ♀ major col capo abbassato.
» 9. — — capo e pronoto di prospetto.
» 10. — ♀.

TAVOLA IX.

Fig. 1. *Cryptocerus umbraculatus* Fab.: a, ♀ min.; b, ♀ maj. col capo abbassato; c, capo e pronoto del medesimo di prospetto; d, ♀; e, capo di ♀ media.

- » 2. *C. cristatus* Em. lettere come sopra.
» 3. *C. gibbosus*, razza *biguttatus* Em.: a, ♀ min.; b, ♀ maj.; c, ♀.
» 4. *C. gibbosus* Sm. forma tipica (del Messico); ♀ media, quasi major. La differenza nella posizione della carena del pronoto rispetto alla fig. 3 b è esagerata, perchè l'esemplare della forma tipica è figurato col torace più inclinato indietro.
» 5. *C. cordatus*, razza *multispinus* Em. ♀.
» 6. *C. complanatus* Guér.
» 7. *C. minutus* Fab.: a, ♀ min.; b, ♀ maj. (di Costa Rica); c, d, capo metanoto e peduncolo della ♀ (del Matto Grosso).
» 8. *C. pusillus* Klug. a, ♀ min.; b, torace di altro esemplare; c, ♀ maj.; d, capo della ♀.
» 9. *C. angulosus* Sp. ♀ min.
» 10. *C. Pinelii* Guér. (esemplari di Rio Grande): a, ♀ min.; b, ♀ maj. col capo disteso; c, ♀ col capo abbassato.









