

FORMICIDARUM SPECIES NOVÆ VEL MINUS COGNITÆ

IN COLLECTIONE MUSÆI NATIONALIS HUNGARICI,
QUAS IN NOVA-GUINEA, COLONIA GERMANICA, COLLEGIT L. BIRÓ.

A CAROLO EMERY,

1900 b

in Archigymnasio Bononiensi zoologiae lectore publico descriptæ.

Publicatio secunda:

(Tab. VIII.)

IV.

Species novæ e subfamiliiis Dorylinarum et Poncerinarum; specierum generis Trapeziopeltae atque generis Ponerae s. str. ex Oceania tabulæ analyticæ.

47. *Aenictus currax* n. sp. (Tab. VIII. fig. 1.)

Operaria. Fusco-nigra, nitida, pilosa, macula magna lutea utrinque ad angulos occipitis, ore, antennis, prothorace, epinoto, petioloque castaneis, geniculis, tibiis tarsisque rufescentibus. Caput oblongum, postice truncatum seu late emarginatum, scapo marginem occipitis haud attingente, funiculi articulis omnibus longioribus quam crassioribus. Caput et thorax levia, nitidissima, punctis minutis, piligeris dispersis; pleuræ striato-rugosæ, opacæ; epinotum superne minutissime punctulatum sed nitidum, basi breviter striatum, dorso mesonoti epinotique inter se loco suturæ angulum obtusum amplectentibus, epinoto ipso postice rotundato. Petiolus et postpetiolus nitidi, hic illo vix latior et paulo brevior, nodo petioli elongato-ovato, nodo postpetioli subrotundo, vix longiore quam latiore, petiolo subtus antice cum lobo obtuso, postpetiolo cum denticulo acuto. — L. 3— $3\frac{1}{4}$ mm.

Ae. levicincti F. Sm. et *gracili* EMERY affinis; a priore capite lateribus minus rotundato, postice latius truncato, maculisque luteis capitis repositis, ab altero postpetiolo minus gracili et haud angustiore quam petiolus, ab utroque antennarum scapo breviore et epinoto petioloque superne nitidis agnoscendus.

* Vide publicationem primam: Természetrajzi Füz. XX. 1897, p. 571—599.

Erimu (*Astrolabebai*).

Adnot. — *Ae. arati*, quem FOREL nuperrime ex Queensland *Australiae* descriptis, L. BIRÓ specimen in silva *Lemien* legit.

48. *Rhopalopone* * *cribrata* n. sp.

Operaria. Fusco-ferruginea, mandibulis, antennis, pedibus anoque rufo-testaceis, breviter oblique pilosa, seu potius longius suberecte pubescens. Caput paulo longius quam latius, postice late arcuatim excavatum, angulis posticis prominulis, clypeo, fronte antice et fovea antennali subtiliter acute striatis, cæterum similiter striatum prætereaque punctis pubigeris magnis, rotundis, profundis, creberrimis, in fronte et vertice longitrosum in sulcos confluentibus. Mandibulæ trigonæ, edentulæ, crebre punctatæ, pubescentes. Oculi nulli. Antennæ scapo marginem occipitis non attingente, articulo secundo duobus sequentibus una subæquali, 4—9 paulo crassioribus quam longioribus, 10—12 clavam efficientibus. Promesonoti sculptura sicut capitis, sed striæ minus distinctæ, linea media sublevi. nitida; epinoti latera antice nitidissima, levia, postice infra striata; dorsum eius striatum et punctatum, medio levigatum, pagina declivis concava, nitidissima, lateribus marginata, angulo utrinque inter ipsam et paginam dorsalem acuto, subdentiformi. Petiolus superne subtrapezoideus, postice latior, a latere visus squama crassa basi crassiore, superne subtruncata, subtus processu compresso, obtuso instructus, nitidus et grosse punctatus. Segmentum abdominis postpetiolare sequenti subæquilongum, nitidissimum, punctis grossis pubigeris discretis; puncta similia sed minora in basi segmenti sequentis observantur. — L. 2¹/₃ mm.

Specimina 3 cribrando collecta.

49. *Rhopalopone* *epinotalis* EMERY.

Ann. Mus. Civ. Genova, v. 38. p. 550. (sine descr.)

Operaria. Fulvo-ferruginea, mandibulis, antennis, pedibus abdome neque dilutioribus. Præcedenti simillima, sed gracilior: caput magis elongatum, circiter quarta parte longius quam latius, occipite minus profunde excavato, subtilius sculptum, punctis in sulcos oblique longitudinales et irregulares confluentibus, fronte et foveis antennalibus similiter sculptis, clypeo tantum striato, mandibulis brevioribus, punctis majoribus, haud crebris. Antennæ articulis 4—9 multo crassioribus quam longioribus. Promesonotum irregulariter longitrosum rugosum, absque linea media levi; epinotum superne et postice leve, nitidissimum, lateribus maxima parte

* Gen. *Rhopalopone* institui in Ann. Mus. Civ. Genova v. 38. p. 549. (1897) pro duabus speciebus hic describendis. A gen. *Typhlomyrmex* differt præsertim thoracis suturis nullis et petiolo antice haud petiolato. *Ponera simillima* F. Sm. Pr. Linn. Soc. London v. 5. p. 105. (nec p. 104.) 1860, ob oculos in mediis capitis lateribus sitos huic generi, sed speciei diversæ pertinere videtur.

striatis, pagina declivi abrupta, subplana, angulis posticis nequaquam dentiformibus. Petioli squama crassior, haud punctata. Abdominis segmentum secundum punctis multo subtilioribus quam in *R. cibrata*, sed crebrioribus et in lateribus magis minusve longitrorsum confluentibus, segmento tertio subtilius punctato. Pedes breviores quam in *R. cibrata*. — L. $1\frac{3}{4}$ mm.

Foemina. Paulo rudius sculpta quam operaria, epinoto superne rugoso, petiolo latiore, segmento postpetiolari scabriore, opaco. Alæ desunt. Oculi majusculi et ocelli adsunt. Color obscurior. — L. parum ultra 2 mm.

Insula Seleo prope *Berlinhafen* quatuor ♀♀. Ad *Paumomu River* ♀ legit. L. LORIA (coll. Musæi Januensis).

50. *Rhytidoponera aenescens* n. sp.

Operaria. *Rh. impressac* MAYR var. *purpureac* EMERY proxima, notis sequentibus agnoscenda: caput angulis posticis magis rotundatis, rugis capitidis magis reticulatis, minus longitudinalibus; thorax robustior, mesonoto minus convexo, postice super epinotum aliquantulum elevato, linea dorsi propterea post mesonotum abrupte depressa, epinoto irregulariter minus transverse, magis reticulatim rugoso; petiolus nodo breviore, superne haud deplanato, sed a latere viso supra, antice cum angulo distincto, postice rotundato; postpetiolus concentrica, rufius striatus; segmentum tertium striis longitudinalibus mediis antrorum convergentibus; coxae antice rugosæ; pili erecti breviores et crassiores. Color fuscus, vel fusco-ferrugineus, subænescens, segmentis abdominalis 2—3 cinereo-ænescentibus, mandibulis, antennis et pedibus magis minusve rufescens. — L. 7— $7\frac{1}{2}$ mm.

Lemien, apud *Berlinhafen*.

51. *Rhytidoponera inops* n. sp.

Operaria. Fusca, subænescens, mandibulis, antennis pedibusque ferrugineo-rufescens, ano flavo-testaceo. Caput ut in *R. metallica*, scultura tamen magis longitudinali, fronte regulariter longitrorsum sulcata. Thoracis structura ut in *R. metallica*, rugæ pronoti longitudinales, antice et lateribus reticulatim confluentes, mesonoti reticulatæ, epinoti superne transversæ, laterum irregulares. Impressio epinoti pro nodo petioli magna, rotundata. Nodus petioli latior quam in *R. metallica*, subglobosus, a latere visus superne et postice valde rotundatus, irregulariter rugosus. Segmentum postpetiolare divergenter longitrorum striatum; segmentum sequens medio subleve, lateribus oblique subtilissime striatum. — L. 5 mm.

Specimen unicum.

Trapeziopelta MAYR.

Species hujus generis hucusque notæ (♀ et ♂) tabulæ sequentis ope
discriminandæ sunt:

1. Species majores; antennæ sine clava distincta	— — — — —	2
Species minores; antennæ clava quadri-articulata	— — — — —	5
2. Anguli capitis postici haud rotundati. (Celebes) <i>T. maligna</i> F. SM. cum varietate nova ex Mentawai.		
Anguli capitis rotundati	— — — — —	3
3. Funiculus articulis omnibus longioribus quam crassioribus. (Papuasia) <i>T. Loriai</i> EMERY.		
Funiculus articulis mediis crassioribus quam longioribus	— — —	4
4. Mandibulæ haud dilatatae	— — — —	(Papuasia) <i>T. latinoda</i> EMERY.
Mandibulæ usque ad dimidiam longitudinem sensim dilatatae, deinde apicem versus angustatae	— — —	(Sumatra) <i>T. Modiglianii</i> n. sp.
5. Processus clypei apice emarginatus	— —	(Sumatra) <i>T. bidens</i> n. sp. Processus clypei angustus, haud emarginatus; species minutiores
6. Processus clypei longus et tenuis plus duplo longior quam latior. (Papuasia) <i>T. xiphias</i> n. sp.		6
Processus clypei brevior	— — — —	(Papuasia) <i>T. tenuis</i> n. sp.

Adnot. — Eadem generi videtur pertinere *Ponera nitida* F. SM. ex Celebes,
in coll. Musei britannici * generi *Brauloponeræ* irrite adscripta.

52. *Trapeziopelta xiphias* n. sp. (Tab. VIII. fig. 2.)

Foemina. Castanea, mandibulis, scapo pedibusque rufo-testaceis,
nitida, dispersissime subtiliter punctata, longe pilosa. Caput longius quam
latius, subrectangulare, antice vix latius quam postice, hic late arcuatim
emarginatum, clypeo brevi, medio elevato et in processum linearem triplo
longiorem quam latiorem producto. Mandibulæ lineares, ultra medium
dente acuto, apice bidentatae. Antennæ scapo marginem occipitalem attin-
gente, articulis 3—8 (funiculi 2—7) brevibus, transversis, quatuor ultimis
clavam efficientibus. Thorax angustus, sua latitudine fere triplo longior,
epinoto obtuse truncato. Petiolus rotundato-subcubicus; segmentum post-
petiolare latius quam longius, segmento sequente brevius, ab eo strictura
forti separatum. Alæ desunt. — L. 4 mm.

Friedrich-Wilhelmshafen; specimen unicum.

53. *Trapeziopelta tenuis* n. sp. (Tab. VIII. fig. 3.)

Foemina. Obscure fusca, mandibulis, antennis, pedibusanoque rufo-
testaceis. Præcedenti simillima, sed minor, processu clypei minus longo et
tenui, antennarum scapo breviore, marginem occipitalem haud attingente,
funiculi articulis mediis brevioribus, mandibularum dente marginali a basi

* Conf. MAYR in: Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, v. 36. p. 362.

magis remoto, epinoto abruptius truncato, petioli squama minus crassa, distinete latiore quam longiore agnoscenda. — L. $3\frac{1}{2}$ mm.

Insula Beliao, prope *Berlinhafen*; specimen unicum.

54. *Pachycondyla* (*Ectomomyrmex*) *acuta* n. sp.

Operaria. Fusco-nigra, mandibulis, scapi basi et apice, funiculo, trochanteribus, genibus, tibiis, tarsis anoque ferrugineis; opaca, abdome postice nitidore, pubescens et pilosa. Caput paulo longius quam latius, lateribus arcuatiss, occipite arcuatim emarginato, punctis pubigeris confluentibus confertissime sculptum, oculis mediocribus (ex stemmatibus circiter 30) a mandibularum articulatione spatio eorum diametro subæquali separatis, clypeo medio carinato, carina antice breviter, acute producta. Mandibulæ striatae et punctatae, margine masticatorio obliquo, 5 dentato. Antennæ seapo marginem occipitalem fere attingente, funiculo clavatim incrassato, articulo antennæ tertio circiter tam longo quam crasso, sequentibus sensim crassioribus, ultimo subcompresso. Thorax dorso continuo, sutura promesonotali distincta, meso-epinotali nulla scuto pleurali * mesothoracis separato. Pronoti convexi, haud marginati mesonotique sculptura ut capitis, sed paulo subtilior, punctis longitrorsum magis confluentibus; meso- et metapleuræ striato-rugosæ; epinotum rufius irregulariter rugosum, pagina declivi transverse striata, concava, margine acuto, crenato circumscripta. Petioli squama ut in *E. javano*, pagina postica longitrorum convessa, in dorsalem oblique transeunte, pagina antica transverse convessa, longitudinaliter concava, antice posticeque transversim striato-rugosa, superne minus regulariter rugosa. Segmentum abdominis secundum confertim longitrorum striato-rugosum et punctatum, tertium magis punctatum, segmenta postrema nitidissima, subtiliter punctata. Pedes pubescentes et parce tenuiter pilosi, metatarsus medii parvis brevis et margine externo aculeatus. — L. $5\frac{1}{2}$ —6 mm.

Poneræ insulanae MAYR proxima, et præcipue sculptura distinguenda.

Ex *Insula Tamara*.

55. *Pachycondyla* (*Pseudoponera*) *stigma* F.** var. *quadridentata*

F. Sm.

Operaria et foemina a speciminibus americanis squama petioli

Pars separata pleurarum mesothoracis in *Ectomomyrmicibus* et nonnullis aliis Ponerinis est pars inferior episternitis sicut alio opere demonstravi (Intorno al torace delle formiche; in: Bull. Soc. ent. ital. Anno 32. 1900, p. 103 et seq.). Genus *Ectomomyrmex* MAYRI generi *Pachycondylæ* ut subgenus subjiciendum censui.

** Generi *Poneræ* LATR. species tantum calcare lateralí (antico) destitutas adscribens, *P. stigma* aliasque in genus *Pachycondylam* sensu lato transferre opus fuit et subgenus novum pro ipsis instituere. De hoc et aliis circum partitionem generum *Poneræ* affinium in opere proxime typis publicandum amplius.

minus lata et paulo crassiore, margine superno magis rotundato distinguendæ.

Mas. Piceus, antennis, pedibus et abdominis apice extremo fusco-testaceis, modice nitidus, tenuiter punctatus, parce pubescens et pilosus, pilis erectis in pedibus paucissimis. Caput transversum, ovatum, oculis magnis, clypeo convexo, antice arcuato, mandibulis minutis, palpis maxillaribus et labialibus 4-articulatis. Antennæ scapo brevissimo, articulo 2° minuto, scapo duplo breviore, 3° et sequentibus valde elongatis, illo plus triplo longiore quam scapus. Mesonotum cum sulcis convergentibus profundis; epinotum rotundatum. Tibiae bicalcaratae. Petioli squama ovata, crassa, antice posticeque convexa, superne rotundata et parum attenuata, subtus antice lobo rotundato; strictura inter segmenta 2. et 3. distincta, pygidium acuminatum tamen non spiniforme. Genitalia pygidium superant, stipite subrecto, simplice, apice rotundato, lamina subgenitali angusta, elongata. Alæ fuscescentes venis fusco-testaceis, stigmate obscure fuso. — L. 5 mm. (Formæ typicæ ex America mas adhuc latet.)

Insula *Beliao*, prope Berlínhaven. — SMITH descriptis hanc formam ex insulis *Aru*. Specimen ex *Celebes* a FRUHSTORFER lectum vidi.

Adnot. — Coloniam observavit Dom. Biró in trunko putrescente, una cum termitibus aliisque formicis. Operarie non tentaverunt auferre aut defendere larvas, que sunt elongatae, antice attenuatae atque tuberculis piligeris instructæ. A termitibus eas aggredientibus ipsæ larvæ motibus subitaneis longi colli sese defundebant, hostes repellere valentes.

Larvas istas alio opere * descripsi: omnes ponerinarum larvæ, quas huensque vidi, antice similiter attenuatae sunt et tuberculis piligeris armatae, quibus aliæ formicarum larvæ carent.

56. *Euponera* (*Brachyponera*) *luteipes* MAYR ** var. *croceicornis* n. var.

Operaria et foemina. Typo quoad structuram corporis et statu ram proxima, oculis paulo minoribus et flagelli dimidio apicali croceo (scapo et flagelli basi fuscis) distinguenda.

Ponera LATR.

Generi *Ponera* sensu stricto species tantum illas adscribendas putavi quæ, sicut typus generis, *P. coarctata*, in tibiis posterioribus calcare uno, scilicet mediali seu postico instructæ sunt, lateralí seu anteriore nullo.

Generis ita circumscripsi species ex Australia, Papuasia et Oceania ope sequentis tabellæ discriminari queunt:

* Interno alle larve di alcune Formiche (Mem. Accad. Bologna [5].v. 8. 1899.).

** Species ob pedes posteriores bicalcaratos a genere *Ponera* excludenda, Conf. notam præcedentem p. 314.

1. Petiolus squama crassa, antice transversim convexa, postice transversim subrecta et longitrorsum convexa, a latere visa angulo supero-antico distinto, supero-postico rotundato, superne visa semicircularis	2
Petiolus aliter formatus	3
2. Minor (2 mm.), petiolo superne opaco (Papuasia) <i>P. clavicornis</i> n. sp.	
Major ($2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm.), petiolo superne nitido. (Papuasia) <i>P. selenophora</i> n. sp.	
3. Sutura meso-epinotalis obsoleta vel vix distincta	4
Suturæ dorsi omnes distinctissimæ	6
4. Oculi mandibularum articulationi proximi. (Queensland) <i>P. coarctata</i> var. <i>Mackayensis</i> * For.	
Oculi ad $\frac{1}{4}$ ad $\frac{1}{5}$ partem anteriorem capitis laterum	5
5. Major ($3\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mm.), sutura meso-epinotalis nulla. (Papuasia) <i>P. Birói</i> n. sp.	
Minor (2— $2\frac{1}{4}$ mm.) sutura meso-epinotalis magis minusve distincta. (Papuasia) <i>P. papuana</i> n. sp.	
6. Squama petioli crassa et humilis	7
Squama petioli crassitie baseos dimidio vel duplo altior	8
7. Fusco-nigra, major (3 mm.) capite opaco. (Nova-Caledonia) <i>P. Andréi</i> n. sp.	
Flavo-testacea, minor ($2\frac{1}{2}$ mm.), capite nitido. (Hawai) <i>P. Gleadowi</i> var. <i>decipiens</i> * For.	
8. Mesonotum pronoto paulo brevius	—
(Hawai) <i>P. Kalakauae</i> * For.	
Mesonotum pronoto tertia parte aut dimidio brevius	9
9. Squama petiolaris superne vix attenuata. Tab. VIII.. fig. 12. (Hawai) <i>P. Perkinsi</i> For.	
Squama superne distincte attenuata	10
10. Species majores : L. $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ mm.	—
Species minores : L. non ultra 3 mm.	—
11. Major (4— $4\frac{1}{2}$ mm.); clypeus carina antice furcata, medio leviter emarginatus; oculi stemmatibus tantum 4 compositi. (Australia) <i>P. truncata</i> var. <i>elliptica</i> * For.	
Minor ($3\frac{1}{2}$ mm.), clypei carina haud furcata, oculi stemmatibus 8 compositi (Queensland) <i>P. queenslandensis</i> * For.	
12. Thoracis dorsum inter mesonotum et epinotum incisum	—
Thoracis dorsum post mesonotum haud incisum	—
13. Oculi stemmatibus 18—20 compositi; squama petiolaris crassior. (Papuasia) <i>P. pruinosa</i> n. sp.	
Oculi stemmatibus tantum 8 compositi; squama tenuior. (Papuasia) <i>P. Mocsáryi</i> n. sp.	
14. Minuta (parum ultra 2 mm.); squama petiolaris fere duplo altior quam basi crassior	—
(Papuasia) <i>P. pallidula</i> n. sp.	
Major; squama crassior, minus alta	—
15. Caput opacum; color fusco-niger. (Queensland) <i>P. trigona</i> subsp. <i>convexuscula</i> * For.	15

Caput subnitidum — — — — (Ceylon, Papuasia) *P. confinis* Rog.

Observatio. — *P. antipodum* For. (Nova-Zelandia) et *P. punctatissima*, subsp. *Schauinslandi* Emery (Insula Laysan), quarum sola ♀ nota est in tabellam assumi non potuerunt.

Species asterisco signatas e descriptionibus tantum novi.

57. *Ponera selenophora* n. sp. (Tab. VIII. fig. 4—6.)

Operaria. Fusco-nigra, mandibulis, antennis, pedibus anoque rufis, capite thoraceque opacis, epinoto et abdome nitidis, copiose flavido pubescens, parce pilosa, pilis versus apicem abdominis longioribus. Caput (sine mandibulis) parum longius quam latius, lateribus modice arcuatiss, occipite late, arcuatim, haud profunde excavato, confertissime punctatum, punctis pubigeris, punctorum interstitiis et fundo opacis. Mandibulæ nitidæ, parce punctatæ, 8—9 dentatæ, dentibus anterioribus majoribus, acutis. Clypeus antice subrectus, haud carinatus; laminarum frontalium discus parvus, ciliatus, medio late sulcatus, sulco frontali dñmidiam longitudinem capitis haud attingente; oculi minutissimi, haud distincte compositi. Antennarum scapus marginem occipitis vix attingens, funiculus apicem versus sensim incrassatus, clava 5 articulata indistincta, articulis omnibus, exceptis primo et ultimo crassioribus quam longioribus. Thorax validus, dorso vix arcuato, haud impresso, paginis epinoti basali et declivi inter se angulum valde rotundatum amplectentibus, sutura promesonotali distincta, meso-epinotali debiliter signata vel obsoleta; mesonotum transversum, pronoto duplo brevius, ambo atque pleuræ et sterna omnia punctata, paulo minus opaca quam caput superne; epinotum nitidum, punctis discretis, piligeris, paulo angustius mesonoto, lateribus concavis, pagina declivi lata, pro receptione squamæ petioli transverse excavata, lateribus marginata. Petioli squama superne visa semilunaris, vel semicircularis, antice convexa, postice subrecta vel transversim subconcava, a latere visa antice subrecta vel leviter concava, superficie postica areuatim in dorsalem transeunte. Abdominis toti sculptura ut epinoti. — L. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm.

Ob petioli structuram et oculos minutissimos in quibus stemmata discreta haud certe cerni possunt insignis.

Lemien, cribrando collecta.

58. *Ponera clavicornis* n. sp. (Tab. VIII. fig. 7—8.)

Operaria. Nigra, mandibulis, antennis, pedibus anoque rufescensibus, punctis pubigeris crebrius sculpta, interstitiis punctorum in capite, thorace et petiolo omnino opacis, gastere minus opaca; pilis erectis nullis nisi in segmentis abdominis apicalibus. Caput longius quam latius, lateribus debiliter arcuatiss, oculis minutissimis, mandibularum articulationi proximis, clypeo modice convexo, margine late arcuato, mandibulis nitidis, parce punctatis, margine masticatorio antice dentibus tribus majoribus,

postice vix crenulato. Antennæ scapo reclinato marginem occipitis haud attingente, funiculi crassi, articulis omnibus excepto 1° et ultimo transversis, scilicet 2—6 brevissimis, 7 majore, una cum 4 ultimis magnis clavam 5 articulatam efficientibus. Thorax dorso subrecto, sutura pro-mesonalni distincta, meso-epinotali obsoleta, epinoti pagina declivi nitida, abrupta, concava, lateribus acute marginata, angulo inter ipsam et basalem rotundato, mesonoto et epinoto paulo angustioribus quam pronotum. Petioli squama a latere visa antice posticeque subrecta, superne oblique truncata, retrorsum declivis, a dorso visa semicircularis vel semilunaris, i. e. antice convexa, postice subconcaava. Segmentum postpetiolare antice truncatum. — L. 2 mm.

Præcedenti affinis, sed minor, magis opaca, et petioli structura diversa agnoscenda.

Friedrich-Wilhelmshafen.

59. *Ponera Birói* n. sp. (Tab. VIII. fig. 9.)

Operaria. Fusco-ferruginea, mandibulis, antennis, pedibus anoque rufis; opaca, creberrime punctata; squamæ petiolaris margine, segmentis abdominis posterioribus pedibusque subnitidis, mandibulis, epinoti pagina declivi, petioli pagina posteriore et superficie segmenti postpetiolaris antica levibus, nitidis; pubescens atque nisi in gastere sine pilis erectis. Caput paulo longius quam latius, postice late arcuatim emarginatum, lateribus arcuatis, antrorum convergentibus, oculis minutis ad $\frac{1}{5}$ longitudinis laterum capitis sitis, clypeo brevi, margine antico medio late arcuato, mandibulis disperse punctatis, elongatis, margine lateralí sinuato, masticatorio dentibus 6—7 majoribus, posterioribus obtusis. Antennæ scapo marginem occipitis fere attingente, articulis funiculi excepto primo et ultimo distincte crassioribus quam longioribus. Thorax dorso subrecto, pronoto rotundato, mesonoto epinotoque sensim angustioribus, sutura meso-epinotali obsoleta, epinoti pagina declivi lateribus marginata, in basalem arcuatim transeunte. Petioli squama ovata, crassiuscula, a latere visa antice posticeque subrecta, superne vix attenuata; segmentum postpetiolare antice truncatum et planum, strictura inter hoc et sequens distincta. — L. $3\frac{1}{8}$ — $3\frac{2}{8}$ mm.

Foemina. Differt ab operaria notis solitis; alæ ignotæ. — L. $3\frac{1}{2}$ —4 mm.

P. Perkinsi For. proxima, sed occipite distinctius arcuatim emarginato, antennarum scapo breviore, funiculo apice paulo crassiore, epinoto magis compresso et sutura meso-epinotali obsoleta agnoscenda.*

* *P. Andréi* n. sp. ♂ (Tab. VIII. fig. 47.) *P. Perkinsi* simillima, fusco-nigra, mandibulis, antennis, pedibus anoque rufescensibus. Sculptura et pubescensia, ut in illa specie. Caput postice profundius arcuatim emarginatum, oculis ad $\frac{1}{6}$ partem

Friedrich-Wilhelmshafen.

60. *Ponera papuana* n. sp. (Tab. VIII. fig. 10—11.)

Operaria. Picea vel (immatura) ferrugineo-testacea, mandibulis, funiculo, trochanteribus, tibiis, tarsis anoque dilutius rufescentibus, capite opaco, thorace abdomineque superne subopacis, lateribus magis minusve subnitidis, tenuiter pubescens, thoracis dorso abdomineque breviter pilosis. Corpus totum creberrime punctatum, interstitiis punctorum opacis, microscopice scabris, squama petioli postice et segmento postpetiolari antice levioribus, nitidis. Caput longius quam latius, postice truncatum, lateribus leviter arcuatis, oculis minutis, paulo ante quartam partem capitatis laterum anteriorem, clypeo medio elevato et obtuse carinato, mandibulis nitidis, subtiliter punctatis, margine lateralii vix sinuato, masticatorio apice dentibus 4 acutis, basi crenato, antennarum scapo marginem occipitis fere attinente, funicolo apicem versus incrassato, clava 5 articulata sat distincta. Thorax dorso late arcuato, haud inciso, sutura meso-epinotali plerumque vix distincta, pagina epinoti declivi marginata, nitida, cum basali angulum valde obtusum (plus quam 120°) amplectente. Petioli squama epinoto latior, paulo magis quam dimidio altior crassitie baseos, paginis antica posticaque subparallelis. Segmentum sequens superficie antica subplana, infra denticulo acuto. — L. 2—2¹/₄ mm.

Foemina. Paulo major (2¹/₄—2¹/₃ mm.) notis solitis ab operaria differt. Alae ignorantur.

In montibus Hansemanni et Insula Tamara.

61. *Ponera pruinosa* n. sp. (Tab. VIII. fig. 13—14.)

Operaria. Obscure fusca, mandibulis, funiculis et pedibus magis minusve fusco-ferrugineis, subopaca, ubique aequaliter, subtilissime punctata et tenuissime pruinoso-pubescentis, pilis in corpore paucis, in pedibus et scapo nullis. Caput (sine mandibulis) paulo longius quam latius, postice arcuatim emarginatum, angulis posticis valde rotundatis, oculis majusculis (stemmatibus in diametro longitudinali 5—6, in uno oculo circiter 20), mandibulis nitidis, denticulatis, dentibus apice tribus majoribus, clypeo basi carinato, margine antico medio in lobulum apice subemarginatum producto, superficie lobuli postice in carinam ascendentem, subconcava, trigona, nitidissima, laminis frontalibus brevibus, disco communi subplano,

anteriorem positis (in *P. Perkinsi* ad 1/5 partem); thorax fere ut in *P. Perkinsi*, suturis distinctis, sed non impressis; petiolus squama ovata, crassissima, antice paulo altiore quam ad basin crassa, a latere visa superne vix attenuata et obtuse subtruncata. — L. 3 mm.

Nova-Caledonia, Noumea. Specimen unicum in coll. Dom. ER. ANDRÉ. — Præsertim squama quam in affinibus multo crassiore agnoscenda. Forsan subspecies *P. Perkinsi*.

margine ciliato, linea frontali subtili usque ad verticem producta. Antennarum scapus marginem occipitis vix attingit, funiculi apicem versus incrassati articuli 2—4 crassiores quam longiores, penultimi tam longi quam crassi. Thorax validiusculus, pronoto et mesonoto una ovatis et convexis, sutura pro-mesonotali distinctissima, dorso in sutura meso-epinotali angulatim impresso, epinoti parte basali antice angustiore quam postice, basi longitrorum convexa in declivem curvatim transeunte, hac transversim concava, utrinque marginata. Petiolus squama ovata, alta, antice postice longitrorum subrecta, antice transversim convessa superne sensim attenuata, crassitie sua ad basin plus quam dimidio altiore : strictura inter segmenta 2—3 vix distincta. — L. $2\frac{3}{4}$ —3 mm.

Insula Tamara et Lemien.

62. *Ponera Mocsáryi* n. sp. (Tab. VIII. fig. 15—16.)

Operaria. Praecedenti simillima sed minor, capite angustiore, minus confertim punctata et parcus pubescens, vix pruinosa, oculis minoribus, stemmatibus 8—10 compositis, clypei carina antice obtusa, tamen marginem anticum medio subangulatim productum fere attingente, antennis minus crassis, thorace paulo graciliore, squama petioli minus crassa, superne magis attenuata. Ceterum *P. pruinosa* similis. — L. $2\frac{2}{3}$ — $2\frac{3}{4}$ mm.

P. pruinosa et *Mocsáryi* sunt *P. truncatae* F. Sm. affines, sed statura multo minore aliisque notis diversae.

Insula Tamara et Lemien : 3 specimina.

63. *Ponera pallidula* n. sp. (Tab. VIII. fig. 17—18.)

Operaria. Flavo-testacea, capite saepe fuscescente, mandibulis, antennis et pedibus flavis, capite superne opaco, thorace abdomineque nitidis, pubescens, pilis fere destituta. Caput latitudine sua maxima circiter quarta parte longius, antrorum aliquantulum angustius, postice truncatum, medio vix arcuatim emarginatum, superne confertissime punctatum, oculis minutis versus $\frac{1}{5}$ partem antican longitudinis, mandibulis elongatis, denticulatis, apice dentibus tribus majoribus, clypeo medio obtuse carinato, antice leviter bisinuato; laminarum frontalium disco deplanato, margine ciliato, sulco frontali subtili usque ad dimidiad capitum longitudinem producto. Antennæ scapo marginem occipitis non attingente, articulo 2 sequentibus una æquilongo, his brevissimis, 4 penultimis parum crassioribus quam longioribus cum ultimo clavam efficientibus. Thorax suturis distinctis, dorso tamen haud impresso, pronoto mesonotoque superne simul ovalibus, epinoto superne illis angustiore, lateribus parallelis, pagina basali et declivi subæquilongis, inter se angulum obtusum atque rotundatum complectentibus, declivi pro receptione squamæ leviter concava. Petiolus squama subcirculari, latiore quam epinoti pars declivis, alta, haud crassa, superne

attenuata, pagina antica convexa, postica plana, ambobus a latere visis subrectis. Segmentum postpetiolare a sequente subaequilongo strictura debili separatum. Thoracis et abdominis sculptura punctis minoribus et minus confertis quam capitis constat, in epinoto majoribus quam in partibus thoracis anterioribus. — L. parum ultra 2 mm.

Friedrich-Wilhelmshafen.

Observatio. — Fœmina in Insula *Luzon* Philippinarum a Dom. E. SIMON collecta eidem speciei pertinere videtur.

64. *Cryptopone fusciceps* n. sp. (Tab. VIII. fig. 19—20.)

Operaria. Ferrugineo-testacea, capite (excepto ore) fusco, mandibulis, scapis, pedibus anoque flavo-testaceis, capite promesonotoque opacis, epinoto, pleuris abdomineque nitidis, dense, brevissime pubescens et disperse, in abdome copiosius breviter pilosa. Caput latitudine sua maxima subaequilongum, antrorum vix angustius, postice truncatum, angulis rotundatis, perminute et densissime punctatum, omnino opacum, oculorum rudimento ad $\frac{1}{5}$ anteriorem, mandibularum margine masticatorio valde obliquo, dentibus 5 acutis, antennarum scapo marginem occipitis haud attingente, funiculo basi tenui, articulis ante clavam 4 articulatam et valde incrassatam brevissimis. Thorax suturis distinctis, non impressis, disco promesonoti ovato, haud dimidio longiore quam latiore, epinoto basi valde angustato, compresso, postice latiore, a latere viso angulo inter paginam basalem et declivem rotundato. Petioli squama a latere visa tam alta quam basi crassa, superne valde attenuata, antice concava, postice subrecta, a dorso visa paulo latior quam longior; strictura inter segmenta 2—3 obsoleta. — L. $1\frac{2}{3}$ — $1\frac{4}{5}$ mm.

Fœmina. Magis opaca, epinoto cuboideo abdomineque subopacis, oculis magnis, planis, capitis laterum plus quam quartam partem occupantibus. Antennæ crassiores quam in ♀, clava magis incrassata; petiolus altior, magis squamiformis. — L. $2\frac{1}{4}$ mm.

C. testaceae simillima, sed minor, oculorum rudimento distincto, antennis crassioribus, squama minus crassa, antice a latere visa concava distinguenda.

Lemien.

65. *Cryptopone tenuis* n. sp. (Tab. VIII. fig. 21—22.)

Operaria et foemina. Colore, sculptura et pubescentia *C. fuscicipiti* similis, paulo obscurior et præsertim notis sequentibus diversa: Caput multo magis elongatum, in operaria latitudine maxima fere quarta parte longius; mandibulæ latiores, margine masticatorio antice dentibus 4 instructo, postice edentulo. Antennarum scapus paulo gracilior. Thorax angustior, superne visus loco suturæ meso-epinotalis multo minus coarctatus, scilicet pronoto multo minus lato, mesonoto postice minus angustato,

epinoti dorso lateribus subparallelis, id est antice vix angustiore quam postice, sutura meso-epinotali superne obsoleta, angulo inter paginam basalem et declivem distincto, pagina declivi subrecta. Petioli squama brevior, in ♀ superne visa semicircularis, epinoto latior, a latere visa antice posticeque subrecta, superne minus attenuata et subtruncata. — L. ♀ $1\frac{2}{3}$ — $1\frac{3}{4}$ mm., ♀ $2\frac{1}{4}$ mm.

Insula Tamara, Lemien; tria specimina.

V.

Species e subfamilia Myrmicinaarum.

66. *Ischnomyrmex dromedarius* n. sp. (Tab. VIII. fig. 23—24.)

Operaria. Nitida, lète rufa, tibiis obscurioribus, scapo fuscō, gasterē flavescente, setulis fuscis, crassis, brevibus, retusis, obliquis copiose hirta. Caput (collo excluso) paulo longius quam latius, postice rotundatum, sed in collum longissimum capitis parte lata (mandibulis exclusis) haud multo brevius, margine postremo infundibuliformi productum, mandibulis subopacis, striatis, denticulatis, dentibus apice tribus majoribus, clypeo convexo, antice medio emarginato, pone marginem transverse striato, area frontali magna, nitidissima, genis et lateribus capitis inter oculum et laminam frontalem oblique striatis. Thorax gracilis, dorso levi, lateribus oblique striatis, pronoto acute gibboso, dorso, a latere viso, post gibberem æqualiter concavo, epinoto in gibberem alterum spinas acutas furcæ instar gerentem elevato. Petiolus nodo brevi longe pedunculato; postpetiolus conicus. Pedes gracieles, geniculis spinis duabus brevibus armatis, tibiis posterioribus ecalcaratis. — L. 9—10 mm.; caput cum collo et mandibulis parum ultra 3 mm.

Species inter omnes congeneres ob collum longissimum et pronotum acute gibbosum insignis.

Var. *fusca* n. var.

Operaria. Typo simillima, sed fusco-nigra, mandibulis, funiculis et tarsis ferrugineis.

In silva *Lemien* et *Insula Tamara*, super folia arborum currens.

67. *Pheidole cervicornis* n. sp. (Tab. VIII. fig. 25.)

Operaria. Fusco-ferruginea, rugosa, opaca, pedibus nitidis, copiose pilosa, gasteris basi flavescente. Caput ovatum, longitrosum sulcato-rugosum, mandibulis striatulis, scapo marginem occipitis paulo superante, articulis 3—9 longitudine sua haud crassioribus, clava modice incrassata. Thorax rugosus, promesonoto elevato, superne planato, antice utrinque spina longa bifurcata, postice spinula erecta. Epinotum superne eminentia

trunciformi in spinas binas magnas desinente, quarum unaquaque in ramum anteriorem breviorem et posteriorem longiorem compressum partitur. Petiolus gracilis, opacus, nodo conico, acuto; postpetiolus parvus, transverse ovalis. Gaster nitida, parte anteriore albida, subopaca. — L. 2 mm.

Lemien: specimen unicum. Ob spinas thoracis furcas inter omnes congeneres insignis. *Miles* ignoratur.

68. *Pheidole sexspinosa* MAYR, var. *fuscescens* n. var.

Miles et operaria. Differt a typo (secundum descriptionem MAYRI) colore obscuriore, fusco-ferrugineo, gaster excepta basi fusca, pedibus et operariæ gasteris basi flavescentibus.

In rupe coralligena ad litus maris.

Subsp. *Birói* n. subsp.

Miles. Typo proximus, sed minor: color fere ut in var. præcedente, pedes et gasteris basis dilutiores; caput magis elongatum, quam in typo; thorax minus rude rugosus, mesonoto sublevi, nitidissimo, gasteris segmenti basalis dimidio antico toto subtiliter striato, subopaco. — L. $2\frac{2}{3}$ — $3\frac{1}{4}$ mm.

Operaria. Typo simillima, sed minor, color fuscus, mandibulis, antennis, pedibus petiolo et postpetiolo flavo-rufescens, femoribus fuscatis, gasteris basi dilutissime albido-flavescens; sculptura ut in typo. — L. $1\frac{1}{2}$ mm.

Mas. Pallide luteus, capite, fascia mesonoti mediali duplice et macula in eodem segmento utrinque elongata fuscis, pedibus et antennis albidis. Caput trapezoideum, paulo latius quam longius, antice latius, oculis valde convexis, dimidium anticum occupantibus, lateribus post oculos subrecte ad ocellos decurrentibus. Epinotum inter paginam dorsalem et declivem utrinque tuberculō obtuso. Petiolus nodo parvo cuneiformi; postpetiolus paulo latior, antice utrinque obtuse angulatus. Alæ hyalinæ costis et stigmate dilutis. — L. $2\frac{2}{3}$ mm.

Friedrich-Wilhelmshafen.

69. *Pheidole umbonata* MAYR, subsp. *fusciventris* n. subsp.

Miles. *Ph. umbonatae* typicæ simillimus sed minor, lâte rufo testaceus, thorace dilutiore, antennis, pedibusque flavis, mandibularum margine gasterisque fuscis. Capitis structura ut in typo, rugæ subtiliores, rugarum frontis et genarum pars usque ad marginem occipitis haud interrupte prolongantur. Thorax omnino ut in typo, petiolus angustior, nodo minus alto, postpetiolus rotundatus, paulo latior quam longior. — L. $1\frac{2}{3}$ —2 mm.

Operaria. *Ph. umbonatae* typicæ simillima, minor et gracilior, flava, capite rufescente, antennarum clava fuscata, gaster fusca. — L. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{3}$ mm.

Friedrich-Wilhelmshafen, Ins. Beliao. Velociter currens; nidus in trunko putrescente.

Adnot. — *Ph. umbonata* MAYR typica etiam a Dom. BIRÓ copiose collecta. — *Seleo, Beliao, Tamara, Rostalou.*

70. *Pheidole lobulata* n. sp.

Miles. Rufo-ferrugineus, nitidus, gastere fusco-flavescente, antennis pedibusque flavis, copiose pilosus. Caput elongatum, postice profunde excisum et medio sulcatum, sine impressione transversa verticis, lobis occipitis rotundatis, clypeo brevi, medio breviter carinato; frons et genae longitrorsum rugosæ, rugis seu carinulis paulo ultra dimidiā capitis longitudinem prolongatis; occipitis latera rugis irregularibus interruptis; laminæ frontales antice in lobum auriformem productæ, postice in rugam subtilem paulo ultra dimidiū caput continuatæ; fovea superficialis rugis destituta utrinque pro apice scapi qui dimidiū spatii inter oculum et marginem occipitis non attingit. Mandibulæ leves, sparse disperse punctatæ. Thorax superne levis et nitidus, lateribus punctatus ut in *Ph. umbonata*, sed latior et robustior, promesonoto valde convexo et utrinque producto, spinis epinoti validioribus. Petiolus latior, postpetiolus utrinque distincte angulatim productus. — L. $2\frac{1}{2}$ mm.

Operaria. *Ph. umbonatae* proxima et paulo validior, laminis frontalibus antice distinete in lobulum elevatis atque spinis epinoti longioribus agnoscenda.

Friedrich-Wilhelmshafen.

71. *Pheidole cryptocera* n. sp. (Tab. VIII. fig. 26—27.)

Miles. Ferrugineus, clypei mandibularumque margine fusco, antennis pedibus et abdomen lutescentibus, capite thoraceque maxima parte opacis, abdome nitido, copiose pilosus et vix pubescens. Caput magnum, quarta parte circiter longius quam latius, lateribus subparallelis, postice profunde angulatim incisum, mandibulis validis, convexis, nitidis, apice bidentatis, clypeo plano, nitido, antice medio anguste emarginato, laminis frontalibus divergentibus, sigmoideis et usque ad $\frac{2}{3}$ longitudinis capitis productis, antice lamelliformibus, elevatis, scrobem scapo æquiloniam limitantibus; vertex sulco longitudinali et impressione transversa distincta. Superficies capitis creberrime reticulato-punctata, præterea rugis in fronte at genis longitudinalibus confertis, in vertice et occipite in retem laxum rugarum transeuntibus, cuius areolæ in occipite nitidæ; scrobs profunda rugis caret et ab impressione pro apice scapi versus oculum oblique descendit. Oculi ad $\frac{1}{3}$ longitudinis capitis. Thorax promesonoto transverso, subrhomboidalis, angulis lateralibus rhombi valde prominentibus, sed rotundatis, sutura mesonotali debili, mesonoto plano, utrinque subemarginato et obtusissime dentato. Dorsum thoracis post mesonotum ad epinotum abrupte descendit, hoc spinis obliquis, mediocribus armato. Thorax sicut caput reticulato-punctatum, pronoto superne rugis nonnullis transversis. Petiolus

superne nodo parvo cuneiformi; postpetiolus paulo latior, transverse subtrapezoideus. Gaster antice dense punctulata, subopaca. — L. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm.

Operaria. Flavo-testacea, capite thoraceque creberrime reticulato-punctatis, opacis, abdomine nitido. Caput tam longum quam latum, lateribus convexis, occipite late emarginato, superne rugis nonnullis longitudinalibus vix conspicuis, clypeo convexo, antice arcuato, laminis frontalibus brevibus, mandibulis trigonis, acute denticulatis, scapo marginem occipitis attingente. Thorax promesonoto convexo, utrinque rotundato et obtusissime angulato, mesonoto postice utrinque obtuse angulato, dorso post mesonotum abrupte descendente, epinoti spinis acutis, pagina declivi ipsius brevioribus. Petiolus nodo angusto, minuto, subcuneiformi; postpetiolus transverse ovalis petiolo circiter dimidio latior; gaster nitidissima. — L. $1\frac{1}{2}$ mm.

Fœmina. Caput brevius quam in milite, sed similiter constructum et sculptum. Thorax nitidus, mesonoto longitrosum striato, scutello nitido, epinoti lateribus rugosis. Petiolus latior, postpetoli anguli anteriores prominentes. — L. 3 mm.

Insulae Beliao et Seleo. Nidus in ligno putrescenti.

72. *Pheidole laminata* n. sp. (Tab. VIII. fig. 28—29.)

Miles. Facie, structura thoracis et petioli sculpturaque *Ph. cryptocerae* proximus; flavo-testaceus, clypei et mandibularum margine fusco, abdomine pedibusque dilutiotibus. Caput paulo magis elongatum, lobis occipitis magis rotundatis, incisura minus lata et minus profunda separatis; mandibulæ minus convexæ, striatulæ, oculi paulo post $\frac{1}{4}$ longitudini capitidis; laminæ frontales antice in laminam angulatam productæ, parum ultra oculum extensæ, scrobe brevissima postice evanescente, impressione pro scapo superficiali, rugis in ipsa debilioribus, sed non omnino evanescentibus; sculptura capitidis paulo subtilior quam in *Ph. cryptocera*. Petiolus, postpetiolus et basis gasteris subopaca, microscopice scabra. — L. $2\frac{1}{4}$ mm.

Operaria. *Ph. cryptocerae* simillima, gracilior et pallidior atque petioli, postpetioli et gasteris basi subopacis agnoscenda. — L. $1\frac{1}{3}$ mm.

Militis specimen unicum cum operariis nonnullis.

73. *Pheidole fuscula* n. sp.

Miles. Fusco-niger, nitidus, mandibulis, genis, antennis pedibusque pallidis, scapo femoribusque fuscatis, mandibulis genisque nonnunquam rufis. Caput paulo longius quam latius, lateribus late arcuatum, occipite angulatim inciso, angulis posticis rotundatis, superne striatum, striis antic confertioribus, postice sensim minus crebris; deinde evanescentibus, occipite extremo lateribusque nitidissimis, punctatis; occiput et vertex cum sulco medio profundo et impressione verticis transversa superficiali, utrin-

que impressione altera sublevi pro apice scapi; clypeus levis, sine carina; mandibulae convexae, leves, disperse punctatae; laminæ frontales non ultra oculum prolongatae, haud elevatae. Antennæ breves, scapo vix dimidium spatii inter oculum et marginem extreum lobi occipitalis attingente, articulis funiculi mediis crassioribus quam longioribus, clava crassiuscula. Thorax pronoto lato, utrinque rotundato, proeminente mesonotoque levibus, nitidisque, hoc convexo, utrinque cum impressione longitudinali, epinoto superne concavo, utrinque carina marginali quæ in dentem seu spinulam acutam desinit. Petiolus nodo subcuneiformi, parte antica segmenti haud latiore, superne rotundato; postpetiolus paulo latior, transverse ovalis. Petiolus, postpetiolus et gaster leves et nitidi. — L. 2— $2\frac{1}{4}$ mm.

Operaria. Color militis; nitidissima, genis circum foveam antennalem striatis, mesopleuris superne punctatis, cæterum levissima, punctis piligeris minutissimis. Caput postice truncatum, angulis posticis lateribusque rotundatis, mandibulis apice bidentatis, cæterum edentulis, levibus, clypeo convexo, antennarum scapo occipitis marginem attingente, funiculo ut in 4. Thorax promesonoto convexo, epinoti pagina basali et declivi subæquilongis, illa deplanata, postice dentibus acutis armata. Petiolus ut in 4; postpetiolus petiolo haud latior, subglobosus. — L. $1\frac{1}{8}$ mm.

Insula Beliao; nidos in trunko putrescente.

74. *Monomorium fossulatum sechellense* EMERY, var. *papuasiæ* n. var.

Operaria. Subsp. *sechellensi* simillima, capite paulo breviore, clypei sub laminas frontales eminentia magis conspicua, epinoto utrinque haud distincte dentato, sed saltem angulato, nodoque petioli postpetiolo paulo latiore (*in sechellensi* paulo angustiore) agnoscenda. Sculptura ut in subsp. *sechellensi*.

Lemien, Montes Hansemanni.

75. *Pheidolegeton affinis* JERD., var. *minor* n. var.

Operariae majoris seu *militis* specimen maximum ocello præditum est multo minor (L. 10 mm., caput cum mandibulis $4 \times 3\frac{1}{8}$ mm.) speciminiibus ocelliferis hujus speciei quæ ex India et Australia vidi. Vertex levior, punctis paucis et rugis obsoletis; cæterum typo similis. — *Operaria minor* a typo haud agnoscenda.

Ex insula Tamara.

Adnot. — Eadem varietati adscribendas censeo fœminas quas ex Insulis Aru olim acceperam, a ♀ *Ph. affinis* typici similiter statura minore (L. 14—15 mm., caput $3\frac{1}{3} \times 3$, ala ant. 11 mm.) et capite minus scabro distinguendas.

Typus speciei in insulis Papuasiae adjacentibus occurrit; ♀ ex Batjan a Dom. STAUDINGER & BANG HAAS emsi.

Aneleus nov. subgen.

Hoc subgenus novum instituendum censui pro speciebus minutis generis *Pheidologeton* quarum milites, quatenus noti sunt, statura et magnitudine capitis haud variantibus ordinem individuorum ab operariis separatum ut in genere *Pheidole* constituere videntur.

Subgeneri adscribendae sunt species sequentes:

- Ph. pygmaeus* EMERY ex Ternate.
- Ph. perpusillus* EMERY ex Africa australi.
- Ph. similis* MAYR ex Nicobar et Papuasia.
- Ph. minimus* n. sp. ex Papuasia.
- Ph. sarasinorum* n. sp. ex Celebes.

76. *Pheidologeton* (*Aneleus*) *minimus* n. sp.

Miles. Fusco-ferrugineus, capite piceo, ore rufo, antennis pedibusque flavescentibus; nitidus, capite superne, pleuris epinotoque opacis, longe oblique pubescens, pilis longioribus paucis in trunco, in pedibus nullis. Caput longius quam latius, lateribus parallelis, subrectis, margine occipitali leviter emarginato, angulis posticis late rotundatis, sulco frontali usque ad occiput extenso, subtiliter et regulariter striatum, scilicet carinulis subtilibus longitudinalibus instruetum, inter quas sulcorum fundus longitrorum striatus et punctis pubigeris regulariter dispositis sculptus; pili subadpressi ex punctis surgentes in fronte et vertice oblique introrsum et retrorsum versi; clypei pars media levis, latera striata; mandibulæ leves, margine masticatorio nigro, dentato. Antennarum scapus dimidiatus capitis longitudinalinem paulo superat, funiculi articulis mediis paulo brevioribus quam crassioribus, clavæ articulo ultimo praecedente crassiore et fere triplo longiore. Thorax pronoto lato, utrinque rotundato, sutura promesonotali subtili, mesonoto postice cum toro scutellari transverso; epinotum confertissime punctatum, utrinque dente magno, acuto. Petiolus nodo alto, lato, subsquamiformi, superne rotundato; postpetiolus nodo petioli paulo latior, transverse ovalis; segmentum gasteris basale antice emarginatum, gasterem fere totam superne tegens. — L. $2\frac{1}{2}$ mm.

Operaria. Color militis, nitida, meso- et metapleuris epinotoque crebre punctatis, opacis. Caput paulo longius quam latius, lateribus arcuatissime, occipite subemarginato, clypei lobo lato, rotundato, genis circum antennarum insertionem subtilissime arcuatim striatis, laminis frontalibus brevibus, oculis minutis; mandibulæ leves, margine masticatorio valde obliquo, 5 dentato. Thorax sutura meso-epinotali profunde impressa, pronoti nequam marginati angulis humeralibus rotundatis, epinoto brevi, paginæ declivis margine lateralí superne in dentem acutissimum producto. Petiolus

nodo rotundato, longiore quam latiore; postpetiolus illo subæquilatus sed brevior, subglobosus. — L. 1— $1\frac{1}{4}$ mm.

Insula Beliao.

77. *Pheidologeton (Aneleus) similis* MAYR * var. *crassiuscula* n. var.

Operaria. A typo speciei ex Insulis Nicobar differt solummodo thorace breviore et latiore.

Friedrich-Wilhelmshafen. Miles ignoratur.

78. *Oligomyrmex atomus* n. sp. (Tab. VIII. fig. 30.)

Miles. Ferrugineus, capite obscuriore, mandibulis, antennis, pedibus petioloque flavescentibus, vel flavescens, capite ferrugineo, nitidus, capite opaco, copiose albido-pubescentibus et parce, longe pilosus. Caput elongatum, circiter $\frac{1}{3}$ longius quam latius, lateribus parallelis, angulis posticis rotundatis, occipite utrinque dente erecto, acuto, inter dentes profunde arcuatim emarginato; clypeus brevis, abrupte declivis, inermis, medio impressus, postice inter laminas frontales breves divergentes productus, area frontali nulla; mandibulæ convexæ, nitidæ, levissimæ, obtuse 4—5 denticulatæ; genæ et frons longitrosum striato-rugosæ, caput cæterum confertissime rugose punctatum, punctis in lateribus occipitis magis confluentibus; oculi minimi ad $\frac{1}{4}$ capitis laterum. Antennæ breves, scapi reclinati apice dimidiadim capitis longitudinem paulo superante, articulo 2. sequentibus tribus una majore, 3—7. brevioribus quam crassioribus. Thorax pronoto magno, subgloboso, nitido, mesonoto brevi, sutura pro-mesonotali distincta, meso-epinotali profunde impressa, epinoto subcubico, utrinque marginato, postice dentibus acutis, confertissime punctato, opaco. Petiolus nodo superne viso rotundato; postpetiolus nodo petioli vix latior et parum brevior, transverse ovalis. — L. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ mm.

Operaria. Color, pubes et pili ut in 4. Caput, thorax et petiolus confertissime punctata, opaca. Caput longitudine sua fere æquilatum, angulis posticis rotundatis, occipite inermi, late, hand profunde emarginato, punctis in toto capite æqualiter confertis, haud confluentibus; mandibulæ minus convexæ quam in 4, acutissime 5 dentatæ; oculi minimi ad $\frac{2}{5}$ longitudinis capitis. Antennarum scapus reclinatus $\frac{3}{4}$ longitudinis capitis attingens. Thorax promesonoto tam lato quam longo, antice arcuato, angulis humeralibus obtusis, postice angustato, sutura pro-mesonotali nulla, meso-epinotali impressa; epinotum ut in 4, utrinque marginatum et dentigerum. Petiolus punctatus, nodo subrotundo; postpetiolus nitidus, nodo petioli subæquali. — L. $\frac{4}{5}$ mm. vel parum ultra.

* *Solenopsis similis* MAYR, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, v. 12. 1862. p. 751. — In specimine typico a Dom. MAYR benigne communicato et in varietate papuana antennæ sunt 11 articulatae. Species propterea a genere *Solenopsi* excludenda.

Montes Hansemanni, Insula Tamara et Beliao; ex trunco putre-scente et etiam cibri opere collecta.

Operaria hujus speciei inter omnes formicas hucusque notas minima.

79. Oligomyrmex subreptor n. sp.

Operaria. Flava, nitida, pube longa oblique abstante copiose vestita et pilis longioribus nonnullis. Caput oblongum, quarta parte circiter longius quam latius, lateribus subparallelis, margine postico leviter concavo; clypeo inermi, sed lobo lato, medio truncato et subemarginato, utrinque obtuse angulato instructo, laminis frontalibus brevibus, oculis perminutis, punctiformibus, nigris. Mandibulæ trigonæ, margine masticatorio acute 5 dentato. Antennarum scapus $\frac{3}{4}$ longitudinis capitidis vix attingit, articuli 3—7 transversi, ultimus praecedente plus quam triplo longior. Thorax sutura meso-epinotali impressa, epinoto utrinque margine ad limitem inter partem basalem et declivem obtuse angulato. Petiolus nodo superne rotundato; postpetiolus nodo petioli vix latior, sed brevior, transverse ovatus. — L. paulo ultra $1\frac{1}{5}$ mm.

Miles ignoratur.

80. Solenopsis maxillosa n. sp. (Tab. VIII. fig. 31—32.)

Operaria. Fusco-picea, nitidissima, petiolo et postpetiolo rufescensibus, mandibulis, antennis, pedibus et abdominis apice pallide ochraceis, punctis dispersis pubem haud copiosam erectam et pilos paucos longiores gerentibus obsita. Caput oblongum, lateribus subrectis, parallelis, postice vix emarginatum; clypeus bicarinatus et dentibus binis acutis, longis, sub-spiniformibus, armatus, et utrinque denticulo altero minutissimo obtuso, marginibus antero-lateralibus late arcuatim emarginatus; oculi minutti, depresso; mandibulæ angustæ, sublineares, margine masticatorio a margine basali haud separato, dentibus quatuor acutis, fuscis, quorum primus paulo ultra dimidiā longitudinem mandibulæ, tres ultimi inter se proximiores. Antennarum scapus marginem occipitis haud attingit, articuli 3—8 crassiores quam longiores. Thorax sutura meso-epinotali profunde impressa, epinoto brevi, rotundo, duplo breviore quam promesonotum. Petiolus antice tenuis, postice nodo alto, superne rotundato, paulo latiore quam longiore, antice subtus dente minuto; postpetiolus subglobosus petiolo paulo latior et minus altus. — L. $1\frac{2}{3}$ mm.

Foemina. Picea, abdomen dilutiore, mandibulis, antennis et pedibus pallide ochraceis, longius copiosiusque pilosa quam operaria. Caput latius quam longius, oculis et ocellis magnis; clypeus dentibus magnis, crassioribus, haud spiniformibus et utrinque dente altero minuto, acuto. Mandibulæ ut in ♀, sed dentibus majoribus. Antennæ 11 articulatæ, scapo ocellum parem vix attingente, articulis 3—9 paulo crassioribus quam longioribus. — L. $4\frac{1}{4}$ mm.

Tamara, Erima. — Foeminam ob mandibularum structuram huic speciei adscripti, etiamsi non fuerit cum operariis capta.

81. *Solenopsis papuana* n. sp.

Operaria. Fusca vel fusco flavescens, ore, antennis, pedibusanoque luteis, nitidissima, parce punctata et ex punctis longe suberecete pubescens vel oblique pilosa. Caput paulo longius quam latius, lateribus late arcuatis, margine postico subrecto, seu vix emarginato, clypeo utrinque arcuatim emarginato, medio bicarinato et bidentato, dentibus haud spiniformibus, oculorum diametro crassitie scapi fere æquali, mandibulis angustis, margine masticatorio quadri-dentato. Antennarum scapi apex $\frac{3}{4}$ longitudinis capitis attingit, articulis 3—8 transversis. Thorax inter mesonotum et epinotum profunde impressus, epinoto breviore quam latiore. Petiolus subtus antice sine dente, superne nodo valde crasso et alto, paulo latiore quam longiore, dorso epinoti subæquilato; postpetiolus nodo petioli vix latior, sed minus altus et antice abruptior quam postice. — L. 1— $1\frac{1}{4}$ mm.

Focmina. Obscurior operaria, punctis pubigeris majoribus, abdomine minus, nitido, creberime subtiliter reticulato. Caput paulo longius quam latius, clypeo fere ut in ♀, antennarum 10 articulatarum scapi apice ocellum imparem vix superante; epinotum a latere visum arcuatum, postice depresso et subimpresso, petioli nodo subcuneiformi, angulo cunei superno, anguste rotundato. postpetiolo nodo petioli latiore, postice rotundato, antice latiore quam postice; pedes pilis longis obliquis. — L. $2\frac{2}{3}$ —3 mm.; caput et thorax $1\frac{1}{4}$ mm.

Prope Berlinhasen et Friedrich-Wilhelmshafen locis plurimis præsertim cribrando lecta.

82. *Crematogaster enneamera* n. sp. (Tab. VIII. fig. 33—35.)

Operaria. Nitidissima, nuda (vix microscopice disperse punctata et pubescens), capite fusco, antice rufescente, ore, antennis, thorace, pedibus, petiolo, postpetiolo et gasteris basi flavo-testaceis, reliqua gastere nigra. Caput lateribus arcuatis, angulis posticis late rotundatis, clypei parte media elevata, utrinque acute marginata, partibus lateralibus depresso, depressione cum fovea antennali continua, laminis frontalibus brevissimis. Antennæ breves et crassæ, novem-articulatæ, scapo marginem occipitis haud attingente, articulis 3—5 transversis, 6—7 minus brevibus, 8—9 clavæ pertinentibus. Thorax crassus, promesonoto supra subdepresso, sutura promesonotali indistincta, epinoto postice late excavato, pagina basali brevissima, utrinque in spinam basi crassam. validam, acutam producto. Petiolus latitudine sua brevior, trapezoideus, antice latior quam postice; postpetiolus transverse ovalis, sine sulco aut impressione mediana. Pedes validiusculi. — L. $1\frac{3}{4}$ mm.

Mas. Sordide flavescens, capite, mesonoti lateribus, scutello et gastere

basí fuscescentibus, ore, antennis, pedibus petioloque albidis. Caput postice angustatum. Antennæ 10-articulatæ, funiculi moniliformis articulo secundo (antennæ 3) maximo, præcedente vel sequente duplo longiore. Petioli nodus et postpetiolus subæquilateri, simul sesqui longiores quam latiores. Alæ hyalinæ, costis albidis. — L. vix ultra 2 mm.

Inter omnes congeneres antennis operariæ 9 articulatis insignis.

Insula Seleo. Nidus in ramulo exsiccato ab eruca perforato; ♀ in nido non erat.

83. *Crematogaster polita* F. Sm. (Tab. VIII. fig. 36—38.)

Operaria. Colore variabili, plerumque castaneo-rufa, capite gastere que fuscis, antennis, petiolo, coxis, trochanteribus et tarsis dilutiōribus, vel etiā tota castaneo-rufa, abdomine fusco, antennis pedibusque magis rufescentibus; nitidissima, copiose (etiam in scapo et pedibus) pilosa. Caput leve, subquadratum, lateribus arcuatæ, occipite late arcuatim emarginato, clypeo medio convexo, sine striis aut carinis, mandibulis nitidis, disperse punctatis. Antennæ 11 articulatæ, scapo marginem occipitis vix superante, funiculi articulis omnibus longioribus quam crassioribus, clava elongata biarticulata (vel subtriarticulata, scilicet articulo 9 præcedente sesqui longiore, sed sequente multum breviore). Thorax levus, meso- et metapleuris longitrorsum rugosus. dorso inter mesonotum et epinotum profunde angulatim constricto, sutura promesonotali superne nulla, eius loco depressione arcuata, promesonoto a latere viso valde arcuato, pronoto fornicato, mesonoto transversim depresso, longitrorsum arcuato; epinotum pagina basali brevi cum declivi angulum modice obtusum sed valde rotundatum amplectente, spina utrinque haud crassa, acuta, margine laterali partis basalis æquilonga, stigmate sub spina magno, luteo. Petiolus plus quam sesqui longior quam latior, superne depresso et postice impressus, elongate ovalis, antice angustatus, subtus inermis; postpetiolus petiolo vix latior, subrotundus, sine sulco longitudinali. — L. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ mm.

Tamara, Seleo. — Specimina pallidiora cum descriptione SMITHI conveniunt. WALLACE speciem legerat in *Dory*.*

Speciem huic affinem legit DOHERTY ad *Humboldt Bay*. C. LE-GUILLOU n. sp. — ♀. Structura corporis *C. politae* affinis, sed major et aliter colorata et sculpta: fusco-nigra, mandibulis, funiculis, petiolo, coxis, trochanteribus, geniculis tarsisque ferrugineis, nitida, pilosa. Caput paulo longius quam latius, lateribus arcuatæ, occipite arcuatim late emarginato, clypeo antice et lateribus, genis et frontis lateribus subtiliter striatis, cæterum leve; mandibulæ striatæ; antennarum scapus marginem occipitis fere attingens, articulis funiculi omnibus longioribus quam latioribus, clava biarticulata (subtriarticulata). Thorax pronoti lateribus et parte dorsali postice mesonotique dorso levibus, cæterum longitrorsum striato-rugosus, promesonoto æquilater fornicato, fundo depressionis inter mesonotum et epinotum a latere viso recto,

84. Crematogaster Birói n. sp. (Tab. VIII. fig. 39—41.)

Operaria. Flava, capite (exceptis mandibulis et antennis) gastereque nigris, nitidissima, vix pubescens et parce longe pilosa, scapo tibiisque etiam pilosis. Caput postice rotundatum, clypei parte media parum elevata, basi longitrorsum rugulosa, utrinque a carina subtili limitata, carinula altera ante antennarum articulationem, laminis frontalibus brevibus, genis breviter striatis, mandibulis angustis 5 dentatis, disperse punctatis. Antennæ 11 articulatæ, longæ et tenues, articulis funiculi mediis vix crassioribus quam longioribus, clava elongata, biarticulata. Thorax sutura pro-mesonotali superne nulla, meso-epinotali haud profunde impressa, promesonoto antice rotundato, superne subdepresso, setis paucis longis ex tuberculis minutis surgentibus quarum una longissima locum anguli humeralis obsoleti signat; epinotum pagina basali a declivi haud distincta; oblique retrorsum descendens, transversim concavum, utrinque spina longa, tenui, acutissima, spinis basi longe distantibus. Petiolus superne depresso, elongatus, ovalis, antice angustatus et subpedunculatus, a latere visus cuneiformis, postice altior quam antice; postpetiolus subglobosus, sine impressione longitudinali, vel tantum postice obsolete impressus. Pedes graciles. L. 2— $2\frac{1}{3}$ mm.

85. Crematogaster flavitarsis n. sp. (Tab. VIII. fig. 42.)

Operaria. Obscure fusca, mandibulis et articulationibus rufescentibus, tarsis flavis; breviter copiose pilosa; caput et thorax confertim subtiliter punctata, subnitida, occipite, promesonoti parte media et epinoto postice levioribus, nitidis, abdомine nitido, thoracis lateribus minus subtiliter punctatis, opacis. Caput latius quam longius, lateribus arcuatiss., margine postico recto, angulis rotundatis, clypei lateribus genisque striatis, mandibulis basi striatis. Antennæ 11 articulatae, scapo marginem occipitis vix attingente, articulis funiculi mediis non crassioribus quam longioribus, clavæ triarticulatae articulo basali sequente multo breviore, præcedente fere sesqui longiore. Thorax superne concavus et marginatus, sutura pro-mesonotali nulla, meso-epinotali impressa, pronoti angulo humerali in spinam trigonam acutam producto, angulo mesonoti postico subdentiformi, epinoto postice arcuatim descendente, transverse late concavo, spinis subtilioribus quam pronoti et acutissimis. Petiolus fere duplo latior quam longior, antice dilatatus, angulis anticis rotundatis, superne depresso; postpetiolus bre-

rude striato, epinoti spinis curvatim deflexis. Petiolus brevius ovalis quam in *C. polita*, sed antice distinctius pedunculatus; postpetiolus striatus, postice impressus et superne depresso, sed non proprie sulcatus. Gaster modice nitens inter puncta piligera subtilissime reticulata. — L. 4 mm.

Duo specimina in coll. EMERY.

vis, transversus, sulco longitudinali medio. Pedes et scapi pilosi. — L. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{2}{3}$ mm.

Insulae Scleo et Tamara.

Cum *C. tarsata* F. Sm. ex Insula Morty plurimis notis convenit, tamen colore diversa; fortasse ipsius varietas. Descriptio SMITHI nimium brevis et incompleta. — Etiam *C. tetracanthae* et *recurvae* EMERY affinis, a priore petioli thoracisque forma diversa, a postrema sutura meso-epinotali impressa agnoscenda.

VI.

Leptomyrmex, Rhizomyrma, Polyrhachis.

86. *Leptomyrmex niger* n. sp. (Tab. VIII. fig. 43.)

Operaria. Fusco-nigra, mandibulis, funiculis et tibiarum apice fusco-testaceis, tarsis pallide-flavis, capite elongato, latitudine sua plus duplo longiore, postice arcuatim attenuato, antennarum gracilium scapo tenuissimo, compresso, petioli humilis, subnodiformis angulo dorsali subrecto, apice rotundato. — L. 8 mm.

Colore et scapo tenui, compresso *L. unicolori* EMERY (ex Queensland) similis, sed capite multo longiore agnoscenda. — In altera specie papuana, *L. fragili* F. Sm. color diversus et caput postice subconice angustatum, petiolus humilior, magis elongatus, scapus subtilior et minus compressus, quapropter *L. nigrum* pro bona specie habendum censeo.

87. *Acropyga* (Rhizomyrma) *oceania* n. sp. (Tab. VIII. fig. 44.)

Operaria. Dilutissime flava, capite rufescente, nitida, pubescens et breviter pilosa, pedibus sine pilis erectis. Caput longius quam latius, lateribus parallelis, postice truncatum, angulis posticis rotundatis, clypeo antice obtusissime biangulato, tertia parte media inter angulos subrecta, laminis frontalibus brevibus, inter se approximatis, oculis punctiformibus ad capitum $\frac{1}{3}$ anteriorem. Mandibulae angustae, margine masticatorio obliquo, acute 4-dentato. Antennae 9 articulatae (nonnunquam 8 articulatae), scapo marginem occipitalem haud attingente, articulo 2-do longiore quam latiore, sequentibus transversis, ultimo magno, elongato, funiculo toto crasso, claviformi. Thorax brevis et altus, promesonoto convexo, postscutello (metanoto) a. mesonoto haud separato, stigmatibus suturæ meta-epinotali proximis. Epinoti pars basalis in declivem curvatim transit. Petiolus squama erecta, parva; gaster elongata. — L. vix ultra 1 mm.

Fœmina. Dilutissime flava, abdomine fuscescente, capite minus diluto, oculis ocellisque nigris. Caput subquadratum, vix latius quam longius, laminis frontalibus ut in ♂, sulco frontali profundo, oculis magnis, laterum capitum tertiam partem occupantibus, clypeo et mandibulis ut in ♂. Antennæ

minus crassæ. Thorax capite vix latior, ovatus. Petiolus ut in ♀. Alæ dilute fuscescentes, costis et stigmate fusco-cinereis, costarum dispositione ut in genere *Plagiolepis*. — L. $2\frac{1}{3}$ mm.

Mas. Color ut in ♀. Caput transverse quadratum, angulis magis rotundatis quam in ♀. Clypeus et mandibulæ ut in ♂ et ♀. Antennæ 11 articulatæ, scapo ocellos attingente, funiculo filiformi, articulo ultimo magno et crassiore. Thorax latus; petioli squama fere ut in ♀; alæ ut in ♀. Genitalium stipes longus et subtilis. — L. $1\frac{1}{4}$ mm.

Friedrich-Wilhelmshafen. Specimina singulatim capta; inter ea una ♀ et unus ♂ quos eidem speciei tribuendos putavi.

Subgenus *Rhizomyrma* a FOREL pro speciebus ex America meridionali institutum, nec hucusque ex aliis regionibus notum erat.

88. *Polyrhachis chartifex* n. sp.

Operaria. Obscure fusca, tarsis, tibiis et trochanteribus rufescensibus, mandibulis rufis, funiculi dimidio apicali croceo; vix pubescens, pilis nisi in clypeo et gastere destituta; thoracis dorso subopaco, cæterum nitida. Caput ovatum, latitudine maxima parum longius, confertim punctatum, mandibulis 5 dentatis, nitidis, clypeo obtuse carinato, antice arcuato, laminationis frontalibus distantibus, sigmoideis, antennis gracilibus, scapo opaco, funicolo setulis brevibus erectis hirsuto.* Thorax gracilis, dorso depresso, lateribus acutis, rugoso-punctatus, pronoto leviter convexo, medio impressione longitudinali signato, angulis humeralibus obtusissimis, mesonoto antice rotundato, postice angustato, parte anteriore subplana, posteriore concava, impressione arcuata has partes separante, epinoti parte basali plana, lateribus subparallelis, paulo longiore quam latiore, postice utrinque dente erecto, acuto. Petiolus squama crassa, rotundato-cubica, utrinque spina brevi, subtili, acuta. Gaster lucida, subtilissime transversim rugulosa. L. 4—5 mm.

Foemina. Sculptura profundiore et confertiore minus nitida, mesonoti scuto longitrussum striato, opaco, epinoti dentibus apice obtusis, spinis squamæ crassioribus, inter spinas angulo impari obtuso ab operaria differt. L. 7 mm.

P. gracili EMERY proxime affinis, sed capite minus elongato, mesonotique lateribus haud angulatim elevatis distinguenda.

Tamara Insula prope Berlinhasen. Nidus chartaceus sub foliis *Caryotae urentis*.

89. *Polyrhachis Andromache* Rog.** var. *semitestacea* n. var.

Operaria. Capite, thorace et squama fusco-nigris, scapi apice, pedibus

* Setulas erectas similes funiculi in *P. Frauenfeldi* MAYR, *Ourinax* Rog., *unicuspis*, *Wallacei*, *gracilis*, *Solmsi*, *lombokensis* et *Fruhstorferi* EMERY observavi.

** Propter synonymiam conf. EMERY in Ann. Mus. Civ. Genova, v. 38, p. 579. 1897.

cum coxis gastereque testaceo-rufis, pube sericea in partibus nigris cinereo-ænescente, in partibus rufis aurea. Ceterum typo similis.

90. *Polyrhachis Calliope* n. sp.

Operaria. Nigra, nitida, gastere obscure violaceo-metallescente, pilis nisi in capite et gastere destituta, mesonoto epinotoque parce aureo pubescentibus. Caput ovatum, regulariter subtilius striatum, clypeo etiam striato, antice in lobum producto, occipite extremo striis destituto, nitido. Thorax validiusculus, superne et lateribus longitrorsum striatus, dorso marginato, pronoto subquadrato, parum latiore quam longiore, angulis anticis in auriulas acutas productis, sutura promesonotali impressa, mesonoto brevi, posterius minus lato, epinoti spinis parallelis, parte basali parum longioribus, petiolo superne deplanato et transversim striato, utrinque spina circum gasteris basin arcuata, gastere micròscopice transverse rugulosa. — L. 4 mm.

Friedrich-Wilhelmshafen.

Inter species descriptas *P. ornatae* MAYR proxima, sed sculptura diversa et pube aurea thoracis in pronoto nulla, in mesonoto pauca facile agnoscenda.

91. *Polyrhachis laciniata* n. sp. (Tab. VIII. fig. 45.)

Operaria. Picea, scapo pedibusque rufescens, corpore toto cum pedibus albido piloso, gastere præter basin nitida, capite thoraceque vermiculato-rugosis, illo rugis longitudinalibus, hoc rugis in pronoto transversis, in mesonoto epinotoque irregularibus, postice magis transversis. Caput postice rotundatum, oculis prominulis, laminis frontalibus distantibus, modice elevatis, clypeo convexo mandibulisque subtiliter striatis. Thorax sutura pro-mesonotali distincta, meso-epinotali obsoleta, pronoto antice et lateribus marginato, angulis anticis acutissimis, mesonoti margine laterali elevato, sinuato, subbilobo, a margine pronoti incisura profunda separato, epinoto spinis obliquis, cornu bovini instar curvatis, ante spinam utrinque lacinia marginis erecta et stigmate prominente. Petiolus spinis longioribus quam epinoti et similiter curvatis, inter ipsas spinula impari acutissima. — L. 4 $\frac{1}{2}$ —5 mm.

Fœmina. Similiter colorata et sculpta, mesonoti disco longitrorsum rugoso, angulis pronoti minus acutis, mesonoto haud marginato, epinoto sine laciniis, spinis hujus segmenti et petioli brevioribus et crassioribus. — L. 6 mm.

Propter spinulam imparem petioli et sculpturam *P. Heinlethi* FOR. proxima, sed thorace alte marginato et lacinia epinoti agnoscenda.

92. *Polyrhachis argenteo signata* n. sp.

Operaria. Robusta, nigra, mandibulis, antennis pedibusque ferrugineis, albido pilosa; superne dispersissime pubescens, in clypeo et lateribus capitis et thoracis copiosius, epinoto pube erecta, copiosa, albida, gasteris

segmentis duobus basalibus vitta longitudinali antice abbreviata ex pube adpressa argentea notatis. Caput et thorax vermiculato-striata, illud longitrosum, hic in pronoto striis arcuatis, in mesonoto longitudinalibus, gaster opaca, subtiliter et regulariter secundum longitudinem striata. Caput subtrapezoideum, angulis posticis rotundatis, laminis frontalibus distantibus, modice elevatis, mandibulis striatis. Thorax sutura meso-epinotali obsoleta, pronoto acute marginato, angulis anticis acutis et productis, marginibus pronoti et mesonoti incisura separatis, epinoto spinis robustis, depresso, acutis, ante spinam lobulo marginis utrinque brevi. Petioli squama haud crassa, spinis longioribus et subtilioribus quam epinoti, gasteris basin amplectentibus, margine supero inter spinas acute angulatim producto. — L. 5 mm.

Præcedenti affinis, sed multo robustior, marginibus thoracis minus altis, et loco laciniae epinoti saltem lobo minuto. Præsertim vitta gasteris longitudinali argentea notabilis.

93. *Polyrhachis Heinlethi* FOR. var. *papuana* n. var.

Operaria. A specimine typico ex *Queensland* differt mesonoto postice angustiore, lateribus sine dentibus, sed margine elevato et sinuato, epinoto ante spinam sine dente, sed lobulo brevi, rotundato.

94. *Polyrhachis croceiventris* n. sp.

Operaria. Nitidissima; tota nigra, gastere croceo, antennis pedibusque obscure ferrugineis; disperse pilosa, vix pubescens. Caput oblongum, postice rotundatum, clypeo gibboso, subcarinato, antice lobo late emarginato, laminis frontalibus longis, leviter sigmoidibus, oculis post dimidiā capitis laterum longitudinem. Thorax gracilis, sutura post mesonotum nulla, dorso haud marginato, pronoto antice utrinque spina valida, compressa, acuta, extrorsum et deorsum flexa, epinoti spinis longis, oblique ascendentibus. Petiolus nodiformis, antice superne angulatus, utrinque spinula tenui, acuta. Antennæ et pedes longi, breviter pilosi. — L. 9—10 mm.

P. nigricipiti F. SM. (*Atalanta* EMERY) proxima, colore, spinis pronoti deflexis et spinulis petioli agnoscenda. In *P. nigricipile*, spinæ pronoti sunt minus compressæ, petiolus loco spinarum dentibus tantum instructus.

95. *Polyrhachis paromalus* F. SM. (Tab. VIII. fig. 46.)

Operaria. *P. mucronatae* et *Hippomanes* affinis, sed major, magis elongata, squama petioli basi crassiore, magis nodiformi, superne magis attenuata agnoscenda. Caput et thorax subnitida, confertim punctata, punctis majoribus dispersis pubigeris; abdomen nitidius punctis minutioribus minus confertis.

In silva Lemien.

Observatio. — Speciem descripsérat F. SMITH ex Insula Ceram. Specimina papuana cum descriptione convenire videntur.

FIGURARUM IN TABULA VIII. EXPLANATIO.

- Fig. 1. *Aenictus curvax* ♀ caput.
 2. *Trapeziopelta xiphias* ♀ caput cum antenna.
 3. " *tenuis* ♀ caput.
 4. *Ponera selenophora* ♀ thorax et petiolus a latere.
 5. " " ♀ petiolus superne.
 6. " " ♀ funiculus.
 7. " *clavicornis* ♀ thorax et petiolus a latere.
 8. " " ♀ funiculus.
 9. " *Birói* ♀ thorax et petiolus a latere.
 10. " *papuana* ♀ petiolus a latere.
 11. " " ♀ funiculus.
 12. " *Perkinsi* ♀ petiolus a latere.
 13. " *pruinosa* ♀ petiolus a latere.
 14. " " ♀ funiculus.
 15. " *Mocsáryi* ♀ thorax et petiolus a latere.
 16. " " ♀ funiculus.
 17. " *pallidula* ♀ thorax et petiolus a latere.
 18. " " ♀ funiculus.
 19. *Cryptopone fusciceps* ♀ thorax et petiolus superne.
 20. " " " " " a latere.
 21. " *tenuis* ♀ " " superne.
 22. " " " " " a latere.
 23. *Ischnomyrmex dromedarius* ♀ a latere.
 24. " " " " ♀ caput superne.
 25. *Pheidole cervicornis* ♀ oblique superne.
 26. " *cryptocephala* ♀ caput superne.
 27. " " " ♀ caput a latere.
 28. " *laminata* ♀ caput superne.
 29. " " " ♀ caput a latere.
 30. *Oligomyrmex atomus* ♀ caput superne.
 31. *Solenopsis maculosa* ♀ capitis pars anterior superne.
 32. " " " ♀ clypeus.
 33. *Crematogaster enneumera* ♀ thorax, petiolus et postpetiolus a latere.
 34. " " " ♀ petiolus et postpetiolus superne.
 35. " " " ♀ antenna.
 36. " *politula* ♀ thorax, petiolus et postpetiolus a latere.
 37. " " " ♀ petiolus et postpetiolus superne.
 38. " " " ♀ funiculus.
 39. " *Birói* ♀ a latere.
 40. " " " ♀ petiolus et postpetiolus superne.
 41. " " " ♀ funiculus.
 42. " *flavitarsis* ♀ thorax, petiolus et postpetiolus superne.

Fig. 43. *Leptomyrmex niger* ♀ caput superne.

- 44. *Acropyga (Rhizomyrma) oceanica* ♀ caput et antennæ superne (specimen antennis 8 articulatis).
 - 45. *Polyrhachis laciniata* ♀ thorax et petiolus oblique.
 - 46. " *paromalus* ♀ thorax et petiolus a latere.
 - 47. *Ponera Andréi* ♀ petiolus a latere.
-

(*Separatim editum est die 1. Augusti 1900.*)

Természetrajzi Füzetek
XXIII. kötet, 1900.

VIII. Tábla.

Emery C.

