

[30 May, 1913]

## FOURMIS DE NIGÉRIE

PAR

A. FOREL

*Sima aethiops* SM.

♀ Lagos, Sud-Nigeria (W. A. LAMBORN).

*Cremastogaster Buchneri* FOR. r. *alligatrix* FOR.

♀ Lagos, Sud-Nigeria (W. A. LAMBORN), avec des Lycaenides.

*Cremastogaster Buchneri* FOR. r. *clariventris* MAYR.

♀ Lagos, Sud-Nigeria (W. A. LAMBORN), avec des Lycaenides.

*Cremastogaster Buchneri* FOR. r. *Winkleri* FOR.

♀ Lagos, Sud-Nigeria (W. A. LAMBORN), avec des Lycaenides.

*Cremastogaster Buchneri* FOR. r. *Laurenti* FOR.

♀ 4 Lagos, Sud Nigeria (W. A. LAMBORN) avec des Lycaenides.

*Pheidole punctulata* MAYR r. *impressifrons* W ASM.

♀ Lagos, Sud-Nigeria (W. A. LAMBORN), avec des Lycaenides.

Variété très rapprochée de la *Pheidole rotundata* FOR. r. *Ilgii* FOR., dont elle est en réalité plus rapprochée que de la *punctulata*.

*Pheidole Aurivillii* MAYR r. *Kasaiensis* FOR.

♀ 2 Lagos, Sud-Nigeria (W. A. LAMBORN), avec des Lycaenides.

*Camponotus akwapimensis* MAYR v. **Poultoni** n. v.

♀ Longueur : 5 millimètres à 7<sup>mm</sup>5.

Diffère du type de l'*akwapimensis* par sa pilosité blanchâtre plus longue et plus abondante, ainsi que par ses pattes et ses antennes brun foncé, avec les funicules et les tarsi brunâtres. La tête de l'ouvrière major a les côtés un peu plus convexes.

Lagos, Sud-Nigeria (W. A. LAMBORN), avec des Lycaenides.

---